


Catalogue of Palaeartic Coleoptera

Volume 2/1

Revised and Updated Edition

Hydrophiloidea - Staphylinoidea



Edited by
I. Löbl and D. Löbl

BRILL

Hydrophiloidea – Staphylinoidea

Revised and Updated Edition

VOLUME 1

Edited by

I. Löbl

D. Löbl



BRILL

LEIDEN | BOSTON

- luridus* Mathieu, 1858: 33
sordidus Marsham, 1802: 403 (*Hydrophilus*)
texanus Spangler, 1961: 117
verrucosus Marsham, 1802: 404 (*Hydrophilus*)
platycephalus interruptus Fairmaire, 1892a: 88 N; EG AFR
senegalensis Laporte, 1832: 398 A; TR AFR
algoensis Péringuey, 1892b: 108
distinguendus Fairmaire, 1893: 147
sulcatus Gory, 1834: pl. 20

family HYDROPHILIDAE Latreille, 1802

subfamily Hydrophilinae Latreille, 1802

tribe Amphiopini Kuwert, 1890

genus *Amphiops* Erichson, 1843: 229 type species *Hydrophilus gibbus* Illiger, 1801

- Cyprimorphus* Fairmaire, 1873: 334 type species *Cyprimorphus compressus* Fairmaire, 1873 (= *Coelostoma senegalense* Laporte, 1840)
caristriplus Jia, 1994: 100 (102) A; FUJ
coelopunctatus F.-L. Jia, 2014 A; HAI
coomani d'Orchymont, 1926: 246 A; GUA HAI HKG MAC ORR
mater Sharp, 1873b: 62 A; BEI FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JA JIA JIX NP SC SCH TIA YUN ZHE ORR
annamita Régimbart, 1903b: 62
pedestris Sharp, 1890: 354
varians d'Orchymont, 1922: 629
mirabilis Sharp, 1890: 355 A; GUA GUX HAI JIA SHN YUN ORR
variolosus Régimbart, 1903b: 63
yunnanensis Fu, 1963: 82 (80)
phallicus d'Orchymont, 1936c: 114 N; EG A; IS AFR
senegalensis Laporte, 1840b: 59 (*Coelostoma*) N; EG MO AFR
abeillei Guillebeau, 1896b: 229
compressus Fairmaire, 1873: 334 (*Cyprimorphus*)
lucidus Erichson, 1843: 231

tribe Berosini Mulsant, 1844

genus *Allocotocerus* Kraatz, 1883: 14 type species *Allocotocerus bedeli* Kraatz, 1883

- Ashnaia* Makhan, 2007a: 1 type species *Ashnaia soesilae* Makhan, 2007
Globaria Latreille, 1829: 521 [HN] type species *Globaria leachii* Hope, 1838
Spheroides Hope, 1838: 168 [HN] (no type species designated)
leachii Hope, 1838: pl. 3 [fig. 6 + p. 167] (*Globaria*) A; GUA GUX ORR
narayanus Hebauer, 2002a: 8 A; NP
striatopunctatus Laporte, 1840b: 57 (*Globaria*) A; SA ORR
subditus d'Orchymont, 1939a: 105 (*Globaria*) A; YUN

genus *Berosus* Leach, 1817: 92 type species *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1760

Hygrotraphus W.J. Macleay, 1873: 131 type species *Hygrotraphus nutans* W.J. Macleay, 1873

Paraberosus Kuwert, 1890a: 113 type species *Paraberosus nigriceps* Kuwert, 1890 (= *Hydrophilus nigriceps* Fabricius, 1801)

subgenus *Berosus* Leach, 1817: 92 type species *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1760

Euberosus Acloque, 1896: 94 type species *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1760

affinis Brullé, 1835: 285 E: AL AU BH BU CR FR GB GR IT MC ME NL PT SL SP TR YU N: AG EG MO TU A: CY

IN IS SY TR

algericus Kuwert, 1890a: 120

murinus Küster, 1844: no.36

pelagicus Kuwert, 1888c: 139

salmuriensis Ackermann, 1853: 197

sardous Kuwert, 1888c: 139

suturalis Küster, 1844: no.37

byzantinus Ganglbauer, 1904a: 225 E: GR A: KZ TR

corrugatus Régimbart, 1906: 266 A: YE (Suqutra) AFR

dentatis Wu & Pu, 1997: 190 [193] A: FUJ GUA GUI HEI HUN JIX SCH SHG YUN

dispar Reiche & Saulcy, 1856: 355 E: "Caucasus" A: IQ IS LE SY TR

fuscostriatus Fairmaire, 1892a: 87 N: AG A: OM SA YE AFR

geminus Reiche & Saulcy, 1856: 356 E: AU CR CZ GE IT PL RO SK "Caucasus"

hispanicus Küster, 1847: no.80 E: AU CR CZ FR GR IT MA NL PT SP N: AG LB MO TU A: TR AFR

lineicollis A. Costa, 1884: 49

subciliaris Rey, 1885b: 348

insolitus d'Orchymont, 1937c: 40 A: IN KU PA SA

japonicus Sharp, 1873b: 61 A: GUA GUI GUX HUB HUN JA JIX SC SCH TAI ZHE

luridus Linnaeus, 1760: 214 (*Dytiscus*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT

NL NR NT PL RO SK SL ST SV SZ UK YU "Caucasus" A: TR WS

chalcaspis Eschscholtz, 1818: 457 (*Hydrophilus*)

fuscus De Geer, 1774: 378 (*Hydrophilus*) [RN]

globosus Curtis, 1828: pl. 240

lapponicus J. Sahlberg, 1894: 47

sculptus Solsky, 1873: 308

nigriceps Fabricius, 1801a: 254 (*Hydrophilus*) A: IN IQ NP OM PA SA UP YE AFR ORR

aeneiceps Motschulsky, 1861: 110

immaculicollis Fairmaire, 1892a: 88

melanocephalus Kuwert, 1890a: 113 (*Paraberosus*)

nigriceps Kuwert, 1890a: 114 (*Paraberosus*) [HN]

problematicus Schödl, 1993b: 214 N: EG A: IN YE

pulchellus W.S. Macleay, 1825: 35 A: HUB HUN FUJ GUA GUI GUX HAI HKG IN JA JIA JIX NP SA SCH TAI UP

YUN ZHE AUR ORR

decrescens Walker, 1859: 258

pubescens Mulsant & Rey, 1858: 319

vestitus Sharp, 1884b: 456

- punctipennis* Harold, 1878: 67 A: ES FE HEI HUN JA JIA LIA MG NMO SC TAI
- rubiginosus* Kuwert, 1890a: 116 A: OM SA YE AFR
australis Péringuey, 1892a: 23 (*Spercheus*)
- signaticollis* Charpentier, 1825: 204 (*Hydrophilus*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GG GR HU IR IT LT MC ME NL NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG MO TU A: AF IN KZ TD TM TR UZ WS
- aericeps* Curtis, 1828: pl. 240
- corsicus* Desbrochers des Loges, 1869: (45)
- krueperi* Kuwert, 1890a: 117
- subgenus *Enoplurus* Hope, 1838: 128 type species *Hydrophilus spinosus* Steven, 1808
- Acanthoberosus* Kuwert, 1888c: 130 type species *Hydrophilus spinosus* Steven, 1808
- Anchialus* Thomson, 1859: 17 [HN] type species *Hydrophilus spinosus* Steven, 1808
- asiaticus* Kuwert, 1888c: 132 A: IN IQ KU TR XIN
- assamensis* Schödl, 1992: 141 A: NP ORR
- atlanticus* Queney, 2007: 93 E: FR
- atrodorsus* Jia & Pu, 1997: 190 [194] A: HEI
- bispina* Reiche & Saulcy, 1856: 356 E: GR IT SP ST UK N: AG EG TU A: AF IN IS KZ LE SY TM TR
aethiops Kuwert, 1888c: 135
numidicus Kuwert, 1888c: 131
- chinensis* Knisch, 1922: 111 A: AF GUA GUX HKG IN KA NP PA SD UP YUN ORR
fallax d'Orchymont, 1937b: 30
- cuspidatus* Erichson, 1843: 228 N: EG AFR
acutispina Fairmaire, 1869a: 196
bispinosus Boheman, 1851: 591
gracilispina Régimbart, 1906: 264
- dentalis* İncekara, Mart, Polat, Aydoğan, Türken, Taşar & Bayram, 2011: 238 A: TR
- elongatulus* Jordan, 1894: 112 A: AF GUA GUX FUJ HKG JIX JA TAI YUN AFR ORR
- fairmairei* Zaitzev, 1908b: 355 [RN] A: FUJ GUA GUX HAI HEN HKG JA NP PA TIA YUN ORR
acutispina Fairmaire, 1889b: 336 [HN]
- fischeri* Schödl, 1993a: 29 A: BEI FE GAN HEI HEN MG TIA
- frontifoveatus* Kuwert, 1888c: 131 E: AB AU BH BU CR CZ FR GE HU IT NR PL RO ST UK YU N: EG A: AF IN KZ TM TR WS
- fulvus* Kuwert, 1888c: 134 E: AU DE FI FR GB GE HU NL SP ST SV A: ES HEN IN KZ MG NMO TM TR WS
- furcatus* Boheman, 1851: 590 N: AG EG AFR
aegyptiacus Kuwert, 1888c: 130
- guttalis* Rey, 1883b: 88 E: FR SP N: AG MO TU A: TR
- huangi* Jia & Pu, 1997: 192 [193] A: YUN
- incretus* d'Orchymont, 1937a: 12 A: GUA GUX HAI HKG JA MAC NP TAI UP YUN ORR
- indicus* Motschulsky, 1861: 110 (*Enoplurus*) A: NP PA UP ORR
- indiges* Schödl, 1992: 150 A: PA ORR

- ineditus* d'Orchymont, 1937a: 11 A: YUN ORR
- jaechi* Schödl, 1991: 118 E: FR GR IT' SP YU N: EG A: TR GAN HEB NMO
- lewisius* Sharp, 1873b: 61 A: BEI FE HEI GUA GUX HKG HUB HUN JA JIA JIX MG NC NMO SC SCH SHA SHG
SHX YUN ZHE ORR
- nipponicus* Schödl, 1991: 123 A: JA ZHE
- spinus* Steven, 1808: 8 (*Hydrophilus*) E: AB AL AU BH BU BY CR DE EN FI FR GB GE GG GR HU IT LA MC
ME NL NR PL RO SK SL ST SV TR UK YU N: T'U A: AF IN KI KZ MG TD TIA TM TR UZ WS XIN
- apicalis* Samouelle, 1832: no. 5-1
- lenkoranus* Kuwert, 1888c: 133
- samarkanti* Kuwert, 1888c: 132
- schusteri* Kuwert, 1888c: 133
- tayouanus* Ueng, Wang & Wang, 2007: 88 [RN] A: FUI TAI ZHE
- salinus* Ueng, Wang & Wang, 2006: 63 [HN]
- yunnanensis* Jia & Pu, 1997: 191 [194] A: YUN
- genus *Regimbartia* Zaitzev, 1908b: 362 [RN] type species *Volvulus inflatus* Brullé, 1835**
- Brachygaster* Mulsant, 1853: 173 [HN] (no type species designated)
- Spheroides* Hope, 1838: 168 [HN] (no type species designated)
- Volvulus* Brullé, 1835: 282 [HN] type species *Volvulus inflatus* Brullé, 1835
- attenuata* Fabricius, 1801a: 253 (*Hydrophilus*) A: AF FUJ GUA GUI HAI HUN JA JIA JIX NP OM PA SC SCH TAI
YE YUN "India" "Kurdistan" AUR ORR
- aenea* Brullé, 1835: 283 (*Volvulus*)
- indica* Mulsant, 1853: 179 (*Brachygaster*)
- metallescens* Mulsant, 1853: 178 (*Brachygaster*)
- profunda* Sharp, 1873b: 62 (*Volvulus*)
- scaphiformis* Fairmaire, 1879a: 83 (*Volvulus*)
- compressa* Boheman, 1851: 588 (*Volvulus*) N: EG AFR
- jaegerskioeldi* Sharp, 1904: 5 (*Volvulus*)
- nilotica* Sharp, 1904: 5 (*Volvulus*) N: EG AFR
- compressa* Régimbart, 1906: 267 (*Volvulus*) [HN]
- tribe Laccobiini Houlbert, 1922
- genus *Arabhydrus* Hebauer, 1997c: 261 type species *Arabhydrus gallagheri* Hebauer, 1997**
- gallagheri* Hebauer, 1997c: 262 A: OM
- genus *Hydrophilomima* M. Hansen & Schödl, 1997: 187 type species *Hydrophilomima jaechi* M. Hansen & Schödl, 1997**
- yunnanensis* M. Hansen & Schödl, 1997: 193 A: YUN
- genus *Laccobius* Erichson, 1837: 202 type species *Chrysomela minuta* Linnaeus, 1758**
- subgenus *Compsolaccobius* Ganglbauer, 1904a: 251 type species *Hydrophilus decorus* Gyllenhal, 1827

- decorus* Gyllenhal, 1827: 275 (*Hydrophilus*) E: EN FI GG LA ST SV UK A: AF ES KI KZ MG QIN TD TM TR UZ
WS
- pallidissimus* Reitter, 1899b: 197 A: AF KI KZ TD TM UZ XIN
- subgenus *Cyclolaccobius* Gentili, 1991: 381 type species *Laccobius rectus* Sharp, 1890
- almoranus* Gentili, 1995: 255 A: UP
- arabicus* Gentili, 1980: 31 N: EG A: SA YE AFR
- bacchusi* Gentili, 1979a: 44 A: HP NP UP
- confusus* Gentili, 1996: 23 A: HP NP PA
- cribratus* Gentili, 1989a: 35 A: NP UP
- cyclicus* Gentili, 1996: 24 A: SD ORR
- fuscus* Gentili, 1995: 256 A: HP UP
- globulus* Gentili, 1995: 257 A: UP
- hainanensis* Jia, Gentili & Fikáček, 2013: 406 A: HAI
- hanka* Gentili & Fikáček, 2009: 612 A: AP
- hingstoni* d'Orchymont, 1926a: 104 A: UP XIZ
- championi* Knisch, 1927: 132
- imperialis* Knisch, 1924b: 35 A: BT NP SD UP
- inermis* Gentili, 1995: 255 A: UP
- osefi* Gentili & Fikáček, 2009: 615 A: AP
- kumaonicus* Gentili, 1988: 36 A: UP
- martini* Jia, Song & Gentili, 2013: 92 A: GUX
- masataakai* Kamite, Ogata & Hikida, 2007: 35 A: JA
- nitidus* Gentili, 1984: 32 A: AHN FUJ HUN JIX SCH SHA ZHE
- patruelis* Knisch, 1924b: 36 A: HP NP PA UP ORR
- inermis* Hebauer & Wang, 1998: 42 (*Oocyclus*) [HN]
- manalicus* Short & Fikáček, 2011: 101 [RN]
- politus* Gentili, 1979a: 46 A: TAI YUN
- flaveolus* Hebauer & Wang, 1998: 41 (*Oocyclus*)
- regalis* Knisch, 1924b: 34 A: UP
- schawalleri* Gentili, 2003: 414 A: NP
- silvester* Gentili, 2006: 72 A: NP
- yunnanensis* Gentili, 2003: 415 A: SW
- zugmayeri* Kniž, 1910b: 454 A: NP XIZ
- subgenus *Dimorpholaccobius* Zaitzev, 1938: 120 type species *Laccobius sulcatulus* Reitter, 1909
- Brachypalpus* Laporte, 1840b: 56 [HN] type species *Hydrophilus bipunctatus* Fabricius, 1775
- Macrolaccobius* Gentili, 1974: 550 type species *Hydrophilus striatulus* Fabricius, 1801
- albescens* Rottenberg, 1874a: 308 E: AU BH CR CZ FR GE IT SL SZ
- similis* Gentili, 1973: 61
- atratus* Rottenberg, 1874a: 308 E: AU BE CZ FR GB GE HU IR NL PT SP N: MO TU
- subregularis* Rey, 1885b: 299
- atricolor* d'Orchymont, 1938a: 4 N: MR

- atrocephalus atrocephalus* Reitter, 1872: 178 E: IT SP N: AG EG LB MO TU A: JS SY AFR
carreti Guillebeau, 1896b: 227 (245)
purpuratus Guillebeau, 1896b: 227
- atrocephalus canariensis* d'Orchymont, 1940d: 71 N: CI
- bipunctatus* Fabricius, 1775: 229 (*Hydrophilus*) E: AL AR AU BE BH BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IR IT LA LT LU MC NL NR NT PL PT RO SK SL SP SV SZ UK YU N: MO TU A: KZ TM TR WS XIN
alutaceus Thomson, 1868: 313
emmeryanus Rottenberg, 1874a: 318
graecus Rottenberg, 1874a: 317
- chiesai* Gentili, 1974: 556 A: IN KZ NP TR
- elmii* Gentili & Sadeghi, 2003: 40 A: IN
- eremita* Gentili, 1989b: 100 A: SA
- gloriana* Gentili & Ribera, 1998: 194 E: SP
- halophilus* Gentili, 1982: 37 A: IN TR
- hauserianus* Kniž, 1914: (116) A: KZ IN IQ TD TM TR
- hindukuschi* Chiesa, 1966: 302 E: AB AR GG RU A: AF HP IN IQ KI NP PA TD TM TR UP UZ
farsicus Gentili, 1975: 128
- hispanicus* Gentili, 1974: 553 E: FR IT SP N: AG MO
- hoberlandti* Gentili, 1982: 35 E: AB A: IN TR
znojki Shatrovskiy, 1984: 320
- hopaensis* Mart, İncekara & Erman, 2003: 77 A: TR
- kashmirensis* d'Orchymont, 1943d: 1 A: KA PA
- levantinus* Balfour-Browne, 1939a: 31 A: IS "Palestine"
- lycius* Gentili & Whitehead, 2000: 74 A: TR
- moraguesi* Régimbart, 1898: 350 E: IT MA SP N: AG MO TU A: IN
peyerimhoffi d'Orchymont, 1939c: 369
- neapolitanus* Rottenberg, 1874a: 308 E: AU CZ FR GE GR IT SL SP SZ N: AG MO TU
laevis Gerhardt, 1877a: 20 [DA]
- obscuratus aegaeus* Gentili, 1974: 558 E: GR TR UK (Krym) A: TR
- obscuratus meridionalis* Gentili, 1974: 560 A: AF TD ORR
- obscuratus obscuratus* Rottenberg, 1874a: 308 E: AB AL AR AU BE BH BU CR CZ FR GB GE GG GR HU IT MC
 ME NL PL PT RO SK SL SP SZ UK A: IN IS TD TM TR AFR
minor Rottenberg, 1874a: 308 [HN]
obscurus Gerhardt, 1877a: 20
regularis Rey, 1885a: 14
rufescens Rottenberg, 1874a: 308 [DA]
- obscuratus orchymonti* Gentili, 1976: 143 A: CY IS LE SY TR
- sculptus* d'Orchymont, 1935: 17 E: FR GB N: MO A: IQ TR
- scutellaris* Motschulsky, 1855b: 84 E: AB BH BU CR GR MC ME SL TR N: EG TU A: CY IS LE TR
sternocrinis Kuwert, 1890a: 77
- simulans* d'Orchymont, 1923a: 7 A: HP NP SCH SD UP YUN ORR
knischi Balfour-Browne, 1939a: 30

- simulatrix* d'Orchymont, 1932b: 398 E: AB AL AU BH BU CR CT CZ FR GB GG GR HU IN IT MC PL RO SK TR
UK (Krym) YU A: AF IN KZ TM TR
kuoverti Zaitzev, 1938: 117
- sinuatus binaghii* Gentili, 1974: 554 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
- sinuatus sinuatus* Motschulsky, 1849: 80 E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IT LA LT NL
NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU
cupreus Rey, 1884b: 267 [HN] [DA]
oblongus Gorham, 1907: 54
- sipylius* d'Orchymont, 1939c: 371 E: AB AR A: IN IQ LE TR
- striatulus* Fabricius, 1801a: 254 (*Hydrophilus*) E: AL AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR
HU IR LA LU MC ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: TU A: KI KZ TR ZU XIN
belgicus Gentili, 1979b: 47
bucciarellii Gentili, 1974: 550
maculiceps Rottenberg, 1874a: 308
maculiceps Gerhardt, 1877a: 17 [HN]
nigriceps Thomson, 1853: 50
purpurascens Newbery, 1908: 30
signiceps Kuwert, 1890a: 78 [DA]
- sulcatulus* Reitter, 1909c: 80 E: AB AR GG A: IN TD TM TR
- syriacus* Guillebeau, 1896b: 228 E: AB AL AU BH BU CZ GG GR HU MC RO SK UK YU N: EG A: AF CY IN IQ IS
JO KI KZ LE SY TD TM TR ORR
afghanus Chiesa, 1966: 301
laevicollis Ganglbauer, 1904a: 254
- torbaticus* Sadeghi & Gentili, 2004: 75 A: IN
- varius* Gentili, 1975: 127 E: AU RO UK
- ytensis* Sharp, 1910b: 250 E: BE CZ FR GB GE IR IT NL PL PT SP SZ N: MO TU
- ziguensis* Jia, 1997b: 650 A: HUB
- subgenus *Glyptolaccobius* Gentili, 1989a: 36 type species *Laccobius affinis* Knisch, 1927
- affinis* Knisch, 1927: 132 A: NP UP
- celsus* Gentili, 1989a: 36 A: NP
- egregius* Gentili, 1995: 252 A: UP
- eliogentilii* Hebauer, 2002a: 14 A: NP
- guttalis* Gentili & Fikáček, 2009: 611 A: NP
- incisus* Gentili, 1989a: 36 A: NP UP
- jaechi* Gentili, 1988: 32 A: NP
- moriyai* Kamite, Ogata & Hikida, 2007: 36 A: JA
- munus* Gentili, 1995: 251 A: NP
- qinlingensis* Jia, Gentili & Fikáček, 2013: 403 A: SHA
- sharmai* Gentili, 1995: 252 A: NP
- subgenus *Hydraxenus* Wollaston, 1867: 40 type species *Hydraxenus subpictus* Wollaston, 1867
Platylaccobius Gentili, 1974: 549 type species *Laccobius mulsanti* Zaitzev, 1908
- femoralis femoralis* Rey, 1885b: 294 E: FR IT

- femorialis mulsanti* Zaitzev, 1908b: 393 [RN] E: FR IT PT SP SZ N: AG MO
pallidus Mulsant & Rey, 1861a: 61 [HN]
- leucaspis* Kiesenwetter, 1870: 68 N: EG A: IN IS LE SA AFR
mascarensis Spangler, 1980: 703
- revelieri* Perris, 1864: 278 E: FR IT PT SP N: AG MO TU AFR
debilis Rottenberg, 1874a: 322
elongatus Tournier, 1878: 437 [HN]
- subpictus erlangeri* Régimbart, 1905: 218 A: SA YE AFR
propinquus Régimbart, 1905: 218
- subgenus** *Laccobius* Erichson, 1837: 202 type species *Chrysomela minuta* Linnaeus, 1758
- albipes* Kuwert, 1890a: 83 E: AL AU BE BH BU CT CZ FR GE GR HU IT NL PL RO SK ST YU "Caucasus" A:
 KZ TR
- bedeli* Sharp, 1884b: 455 A: FE HEI JA LIA NMO SC
binotatus d'Orchymont, 1934b: 109 A: ANH BEI CHQ FE FUJ GAN GUA GUI HEI HEN HUB HUN JIL LIA NMO
 NC QIN SC SHA SHN SHX YUN ZHE
czerskii Zaitzev, 1938: 116
- cinereus* Motschulsky, 1860b: 103 A: ES FE KI LIA MG NMO QIN SHX UZ
densatus Rey, 1884b: 267 [DA]
littoralis J. Sahlberg, 1900b: 189
- colon* Stephens, 1829c: 133 (*Hydrobius*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IR LA LU MC NL NT
 PL RO SK SL ST SV SZ UK YU A: ES FE HEI KZ MG NIN NMO SHA TIA UZ WS XIN
biguttatus Gerhardt, 1877a: 23
mongolicus Gentili, 1973: 62
nanulus Rottenberg, 1874a: 316
- expectans* Gentili, 1980: 30 A: BEI SHN
- inopinus* Gentili, 1980: 30 A: FE FUJ GUA JA JIL JIX LIA
miyuki Matsui, 1986: 86
- kunashiricus* Shatrovskiy, 1984: 308 A: FE JA
- minutus* Linnaeus, 1758: 372 (*Chrysomela*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT
 MC ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: ES FE HEI KI KZ MG NMO SHA TR WS XIN
chrysolimulus O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*)
coccinelloides Schrank, 1781: 199 (*Dytiscus*)
dermestoides Forster, 1771: 53 (*Dytiscus*)
globosus Heer, 1841: 481
perla Geoffroy, 1785: 12 (*Scarabaeus*)
marginellus Herbst, 1784: 129 (*Dytiscus*) [DA]
minimus Gredler, 1863a: 77 [DA]
pallidus Laporte, 1840b: 57 (*Brachypalpus*) [DA]
- nobilis* Gentili, 1979a: 34 A: FE FUJ GUI HUB HUN JIX SCH YUN
- subgenus** *Microlaccobius* Gentili, 1974: 550 type species *Laccobius gracilis* Motschulsky, 1855
- algoricus* M. Hansen, 1999a: 147 [RN] E: GR IT N: AG EG TU A: SA AFR
minimus Kuwert, 1890a: 76 [HN]

- alternus* Motschulsky, 1855b: 84 E: AL AR AU BH CR CZ FR GE GR HU IT MC PL RO SK SL SP ST SZ UK YU
 "Caucasus" A: TR
gracilis Rottenberg, 1874a: 320 [HN]
nigritus Rottenberg, 1874a: 320
peezi Chiesa, 1959: 133
andersi Hebauer, 2002b: 16 A: FE
argillaceus J. Sahlberg, 1900b: 188 A: KI NP SD TD UP ORR
cretaeus Gentili, 1975: 132 E: GR (Kriti)
elegans Gentili, 1979b: 45 A: FUJ HEN SCH SHA SHN YUN ORR
exilis Gentili, 1974: 560 A: AF BT CY IN NP PA SCH SD TD TM TR UP UZ ORR
eximius Kuwert, 1890a: 71 A: SA YE (Suqutra)
florens Gentili, 1979a: 48 A: FUJ GUA GUX SHN
formosus Gentili, 1979a: 48 A: FE GAN GUA GUX HAI HUB HUN JIX LIA SHA SHN TAI ORR
fragilis Nakane, 1966: 57 A: GAN JA LIA SC SHA TAI
gangeticus Gentili, 1979a: 37 A: NP SD UP
gracilis gracilis Motschulsky, 1855b: 84 E: AL AU BE BH BU BY CR CZ FR GE GG GR HU IT MC ME PL PT RO
 SK SL SP ST SZ TR UK N: AG CI LB MO TU A: IN IS TR
intermittens Kiesenwetter, 1870: 69
signatus Kuwert, 1890a: 79
subtilis Kiesenwetter, 1870: 69
viridiceps Rottenberg, 1870: 23
gracilis sardeus Baudi di Selve, 1864: 222 E: IT (Sardegna)
gracilis sellae Sharp, 1874d: 317 E: IT
hammondi Gentili, 1984: 31 A: AHN BEI FUJ GAN GUA GUI GUX HUN JIX LIA SCH SHA SHN TAI
harteni Fikáček, Gentili & Short, 2010: 142 A: AE
hebaueri Gentili, 1989b: 100 N: EG
himalayanus Gentili, 1988: 34 A: NP SD YUN ORR
indonesiae Gentili, 1979a: 47 A: SD ORR
kaszabi Chiesa, 1966: 300 A: AF KA PA
kyrgyzicus Gentili, 2003: 423 A: KI
laotianus Gentili, 1979a: 40 A: NP ORR
macrophthalmus Gentili, 1982: 32 A: IN
minor Wollaston, 1867: 42 (*Hydroxenus*) A: IS LE SA YE AFR
mistus Gentili, 1989a: 35 A: NP SD
nakanei Gentili, 1982: 33 A: JA
nepalensis Gentili, 1982: 33 A: HAI NP SD ORR
orientalis Knisch, 1924b: 33 N: TU A: AF BT IN IQ KU KZ NP SD TD TM UP ORR
orsenigoi Gentili, 1980: 31 A: IN
oscillans Sharp, 1884b: 455 A: FE JA NC SC
nipponicus Gentili, 1979a: 43
ovatus Gentili, 1979a: 36 A: IN ORR
persicus Gentili, 1974: 562 E: AB A: IN TR

philipinus Gentili, 2005: 362 A: TAJ ORR

praecipuus Kuwert, 1890a: 81 N: AG CI EG A: AE IS OM QA SA YE AFR

singularis Kuwert, 1890a: 71

thermalis J. Müller, 1941b: 326

problematicus Gentili, 1988: 35 A: BT NP SD UP

quaesitus Gentili, 1988: 35 A: IN NP PA TM TR

roseiceps Régimbart, 1903b: 59 A: HKG JA NP UP AUR ORR

satoi Gentili, 1989a: 35 A: JA

shatrovskiyi Gentili, 1988: 35 A: TD

sinicus Gentili, 1975: 129 A: XIN

sublaevis J. Sahlberg, 1900b: 189 A: KI KZ NP TD TM UP UZ

thermarius jelineki Gentili, 1975: 130 E: SK

thermarius thermarius Tournier, 1878: 436 E: SZ

tonkinensis Gentili, 1979: 42 A: SHA ORR

yonaguniensis Matsui, 1993: 319 A: JA

subgenus *Notoberosus* Blackburn, 1895a: 30 type species *Notoberosus zietzi* Blackburn, 1895

Ortholaccobius Ganglbauer, 1904a: 251 type species *Laccobius pommayi* Bedel, 1881

pommayi Bedel, 1881: 313 N: AG MO TU

genus *Oocyclus* Sharp, 1882: 61 type species *Oocyclus brevicornis* Sharp, 1882

Enochroides Kuwert, 1890a: 62 type species *Enochroides decorus* Kuwert, 1890

Beralitra d'Orchymont 1919: 145 type species *Beralitra obscura* d'Orchymont 1919

bhutanicus Satô, 1979: 53 A: BT NP TAI ORR

dinghu Short & Jia, 2011: 66 A: GUA

fikaceki Short & Jia, 2011: 65 A: FUJ GUA JIX

magnificus Hebauer & Wang, 1998: 43 A: TAI

shorti Jia & Maté, 2012: 81 A: GUA HKG

sumatrensis d'Orchymont, 1932c: 685 A: HAI ORR

nudus Balfour-Browne, 1939d: 296

genus *Paracymus* Thomson, 1867a: 120 type species *Hydrophilus aeneus* Germar, 1824

Eumetacymus Brèthes, 1922: 263 type species *Eumetacymus virescens* Brèthes, 1922 (= *Paracymus rufocinctus* Bruch, 1915)

Paracymorphus Kuwert, 1888a: 39 type species *Paracymorphus globuloides* Kuwert, 1888 (= *Hydrobius scutellaris* Rosenhauer, 1856)

Quasiparacymus Marjanian, 2009: 124 type species *Hydrobius chalceolus* Solsky, 1874

aeneus Germar, 1824: 96 (*Hydrophilus*) E: AL AU BU CR CZ DE FR GB GE GR IR JT NL NR PL PT RO SL SP ST SV UK "Caucasus" N: EG TU A: ES FE IN IS KI KZ MG TD TM TR XIN "Middle Asia"

cupreus Dalla Torre, 1877: 68 (*Laccobius*)

punctulatus Sturm, 1836: 15 (*Hydrobius*)

salinus Bielz, 1851: 152 (*Hydrobius*)

- atomus* d'Orchymont, 1925b: 202 A: FUJ GUA HAI JIX ORR
chalconotus Solsky, 1874: 149 (*Hydrobius*) E: AB ST A: AF TR UZ
caucasicus Kuwert, 1890a: 65
maximus Peyerimhoff, 1929c: 121 N: TU
mimicus Wooldridge, 1977: 123 A: HAI ORR
orientalis d'Orchymont, 1925b: 201 A: FUJ GUA GUI GUX HAI JA JIX NP ORR
satsumanus Matsui, 1986: 88
phalacroides Wollaston, 1867: 47 (*Hydrobius*) E: FR SP N: MO AFR AURI NTRI
punctillatus Rey, 1885b: 273
relaxus Rey, 1884b: 267 E: CR GG GR IT RO SP ST N: AG CI EG LB TU A: CY IN IQ IS KU NP SA TD TM TR
XIN YE
schneideri Kuwert, 1888c: 293
scutellaris Rosenhauer, 1856: 57 (*Hydrobius*) E: AL BE BU CR FR GB GE GR IR IT NL PT SL SP N: AG MO TU A:
CY TR
globuloides Kuwert, 1888a: 39 (*Paracymorphus*)
nigroaeneus J. Sahlberg, 1875: 219 (*Anacaena*)
vulgatus Wooldridge, 1977: 120 A: NP PA SD UP ORR
zaitzevi Shatrovskiy, 1989: 290 A: FE
- genus *Pelthydrus* d'Orchymont, 1919: 150** type species *Pelthydrus sculpturatus* d'Orchymont, 1919
subgenus *Globipelthydrus* Schönmann, 1994: 193 type species *Pelthydrus jendeki* Schönmann, 1994
championi d'Orchymont, 1926b: 241 A: UP ORR
dudgeoni Schönmann, 1994: 213 A: GUA GUX HKG JIX
grossus Bian, Schönmann & Li, 2009: 59 A: YUN ORR
horaki Schönmann, 1994: 218 A: GUX HKG ORR
longifolius Bian, Schönmann & Li, 2009: 61 A: GUI HUN FUJ JIX
okinawanus Nakane, 1982: 102 A: JA
rosa Bian, Schönmann & Li, 2009: 62 A: HUN
subgrossus Bian, Schönmann & Li, 2009: 60 A: HUB
vietnamensis Schönmann, 1994: 214 A: YUN ORR
waltraudae Bian, Schönmann & Li, 2008: 267 A: HAI
subgenus *Pelthydrus* d'Orchymont, 1919: 150 type species *Pelthydrus sculpturatus* d'Orchymont, 1919
angulatus Bian, Schönmann & Li, 2008: 268 A: HAI
fenestratus Schönmann, 1995: 133 A: GUX HKG HUN JIX
inaspectus d'Orchymont, 1926b: 237 A: YUN
incognitus Schönmann, 1995: 139 A: HKG ORR
insularis Schönmann, 1995: 129 A: GUX HKG
japonicus Satô, 1960: 78 A: JA
jengi Schönmann, 1995: 140 A: TAI
minutus d'Orchymont, 1919: 153 A: GUX HKG HAI NP TAI UP ORR
nepalensis Schönmann, 1995: 133 A: NP XIZ YUN

sculpturatus d'Orchymont, 1919: 153 A: YUN ORR
speculifer Schönmann, 1995: 142 A: HKG
tongi Bian, Schönmann & Li, 2008: 271 A: HAI
vitalisi d'Orchymont, 1926b: 239 A: GUA HAI HKG TAI ORR
yulinensis Bian, Schönmann & Li, 2009: 63 A: GUI

tribe Hydrobiusini Mulsant, 1844

genus *Amator* A.P. Semenov, 1900c: 614 type species *Amator rudesculptus* A.P. Semenov, 1900
elongatus Ji & Schödl, 1998: 215 A: SCH
rudesculptus A.P. Semenov, 1900c: 617 A: BT HP KZ NP SCH SD TD XIZ YUN
oberthuri d'Orchymont, 1942e: 18
wittmeri Sató, 1977: 200
rugosus Knisch, 1924b: 32 (*Hydrocycclus*) A: BT HP NP SCH SD UP XIZ YUN
rufrena d'Orchymont, 1942e: 15 (*Hydrocassis*)
scabrosus Horn, 1873a: 133 (*Hydrobius*) A: FE JIL NAR
granulosus d'Orchymont, 1942e: 19
lucifer Shatrovskiy, 1989: 289 (*Hydrocassis*)
xizangensis Jia & Zhao, 2013: 128 A: XIZ

genus *Hydrobius* Leach, 1815: 96 type species *Dytiscus fuscipes* Linnaeus, 1758 (ICZN, 1990)

Limnohydrobius Reitter, 1909a: 357 type species *Hydrobius convexus* Brullé, 1835
arcticus Kuwert, 1890a: 34 E: FI NR NT SV A: ES TR
frigidus Poppius, 1909b: 30
convexus Brullé, 1835: 282 E: FR IT PT SP N: TU A: TR
grandis Motschulsky, 1859a: 128 (*Limnoxenus*)
fuscipes Linnaeus, 1758: 411 (*Dytiscus*) E: AB AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA
 LT LU NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG TU A: CY ES FE IN IQ IS KZ MG NMO SY TD
 TR UZ WS XIN NAR
aeneus Solier, 1834: 314
aestivus Rey, 1885b: 246
angustatus A. Villa & G.B. Villa, 1898: 63 (*Hydrophilus*)
aquaticus Linnaeus, 1760: 139 (*Scarabaeus*)
arcadius Brullé, 1832: 164
baleareicus L.W. Schaufuss, 1882b: 528
brevior Kuwert, 1890a: 33
chalconotus Stephens, 1829c: 128
fuscipes O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*) [HN]
fuscipes Steven, 1808: 8 (*Hydrophilus*) [HN]
gyrinoides Schrank, 1781: 199 (*Dytiscus*)
insculptus LeConte, 1855: 372
levigatus Laporte, 1840b: 55

- picicrus* Thomson, 1884b: cxxxi
regularis LeConte, 1855: 372
rottenbergii Gerhardt, 1872: 3
scarabaeoides Linnaeus, 1758: 413 (*Dytiscus*)
seriatus LeConte, 1855: 372
subrotundus Stephens, 1829c: 128
orientalis Jia & Short, 2009: 26 A: GUA
pauper Sharp, 1884b: 452 A: JA
pui Jia, 1995: 131 A: QIN
punctistriatus Jia, 1995: 133 A: HEI

genus *Hydrocassis* Fairmaire, 1878a: 88 type species *Hydrocassis scapulata* Fairmaire, 1878

- Hydrocylus* Sharp, 1884b: 451 type species *Hydrocylus lacustris* Sharp, 1884
anhuiensis Ji & Schödl, 1998: 212 A: ANH JIX
baoshanensis Schödl & Ji, 1995: 233 A: YUN
gansu Jia & Zhao, 2013: 131 A: GAN
hebaueri Schödl, 2000: 178 A: GUA ORR
imperialis Knisch, 1921b: 105 (*Hydrocylus*) A: FUJ HUN JIX
jengi Satô, 1998: 82 A: JA
lacustris Sharp, 1884b: 451 (*Hydrocylus*) A: JA
metasternalis Schödl & Ji, 1995: 231 A: YUN ORR
mongolica Liu, Ji & Jing, 2008: 175 A: NMO
pseudoscapha Ji & Schödl, 1998: 212 A: ANH
scapha d'Orchymont, 1942e: 13 A: FUJ GUA GUX HUN JIX SCH ORR
vietnamica Satô, 1995: 129
scaphoides d'Orchymont, 1942e: 14 A: YUN ORR
scapulata Fairmaire, 1878a: 89 A: GAN HEB SHA SHX SCH
schillhammeri Schödl & Ji, 1995: 234 A: YUN
sichuana Ji & Schödl, 1998: 214 A: SCH
taivana Satô, 1971: 35 A: TAI
uncinata Ji & Schödl, 1998: 214 A: YUN ORR

genus *Hydrocassis*, **nomen dubium**

- formosa* Knisch, 1921b: 103 (*Hydrocylus*) A: FUJ

genus *Limnoxenus* Motschulsky, 1853b: 10 type species *Hydrophilus oblongus* Herbst, 1797 (= *Hydrophilus niger* Gmelin, 1790)

- niger* Gmelin, 1790: 1944 (*Hydrophilus*) E: AU BU BY CR CZ DE FR GB GE GR HU IR IT NL PL PT RO SK SP ST
 YU "Caucasus" N: AG MO A: IN IS LE SY TR
oblongus Herbst, 1797: 300 (*Hydrophilus*) [HN]
olmoi Hernando & Fresneda, 1994: 81 E: PT SP

tribe Hydrophilini Latreille, 1802

genus *Brownephilus* Mouchamps, 1959: 300 type species *Neohydrophilus levantinus* Balfour-Browne, 1939
levantinus Balfour-Browne, 1939a: 34 (*Neohydrophilus*) A: JO
major Incekara, Mart, Polat & Karaca, 2009: 318 (*Hydrochara*) A: TR

genus *Hydrobiomorpha* Blackburn, 1888b: 814 type species *Hydrobiomorpha bovilli* Blackburn, 1888
Neohydrophilus d'Orchymont, 1911: 59 type species *Hydrophilus deplanatus* d'Orchymont, 1911
spinicollis nordica Mouchamps, 1959: 315 A: BT NP SD ORR
spinicollis spinicollis Eschscholtz, 1822: 41 (*Hydrophilus*) A: FUJ GUA GUX HKG JIX YUN "India" ORR
elongata Régimbart, 1902b: 471 (*Hydrophilus*)
wencki Paulino d'Oliveira, 1880: 156 (*Hydrophilus*) N: EG AFR
loanei Camerano, 1907: 4 (*Hydrophilus*)

genus *Hydrochara* Berthold, 1827: 355 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
Hydraechus Stephens, 1839: 88 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
Hydrochares Sharp, 1873b: 58 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
Hydrocharis Hope, 1838: 125 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
affinis Sharp, 1873b: 58 (*Hydrochares*) E: ST "Caucasus" A: ANH BEI ES FE FUJ GAN GUA GUI HEI HEN HUB
HUN JA JIL JIX KZ LIA MG NMO SC SCII SHG SHN SHX TD UZ XIN YUN ZHE
caraboides Linnaeus, 1758: 411 (*Dytiscus*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA
LT LU NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: ES TR WS
costata Lüderwaldt, 1897: 126 (*Hydrous*)
flaviventris G. Ochs, 1923: 46 (*Hydrophilus*)
intermedia Mulsant, 1844a: 133 (*Hydrous*)
nigricornis De Geer, 1774: 376 (*Hydrophilus*) [RN]
scrobiculata Panzer, 1799c: no. 11 (*Hydrophilus*)
smaragdina Bach, 1856: 246 (*Hydrophilus*) [HN]
subaenea Motschulsky, 1845a: 32 (*Hydrophilus*)
substriata Sturm, 1843: 330 (*Hydrophilus*)
dichroma Fairmaire, 1892b: 144 (*Hydrous*) E: BU GR HU ST TR UK A: CY IN IS KI SY TD TM TR UZ WS XIN
subvariolosa A.P. Semenov, 1900b: 585 (*Hydrophilus*)
flavipalpis Boheman, 1851: 595 (*Hydrophilus*) A: OM YE AFR
flavipes Steven, 1808: 3 (*Hydrophilus*) E: AB AU BU CR CZ FR GE GG GR HU IT LA MC PL RO SK SL SP ST UK
YU N: EG MO A: AF GAN IN IQ KU KZ TD TM TR UZ XIN
profanifuga A.P. Semenov, 1900b: 583 (*Hydrophilus*)
libera Sharp, 1884b: 450 (*Hydrocharis*) A: BEI FE HEI JA JIA LIA NC
semenovi Zaitzev, 1908a: 150 (*Hydrophilus*) E: GG UK (Krym)
similis d'Orchymont, 1919: 162 (*Hydrophilus*) A: "India"
vicina Bameul, 1996: 5 A: NC

genus *Hydrophilus* Geoffroy, 1762: 180 type species *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758

- subgenus *Hydrophilus* Geoffroy, 1762: 180 type species *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758
Hydrodema Laporte, 1840b: 51 type species *Hydrophilus albipes* Laporte, 1840
Hydrosoma Laporte, 1840b: 50 type species *Hydrophilus latipalpus* Laporte, 1840
Hydrous Linnaeus, 1775: 7 [RN] type species *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758
Pagipherus Kuwert, 1893b: 82 type species *Hydrophilus triangularis* Say, 1823
Stethoxus Solier, 1834: 302 type species *Hydrophilus ater* Olivier, 1793 (= *Hydrophilus ensifer* Brullé, 1837)
- acuminatus* Motschulsky, 1854: 44 A: BEI FE GUA GUI GUX HEB HEN HKG JA JIX LIA NC NMO SC SCH SHG
 TAI TIA XIZ YUN ZHE ORR
cognatus Sharp, 1873b: 57
pallidipalpis W.S. Macleay, 1825: 35 (*Hydrous*) [DA]
sumatrae Kuwert, 1893b: 85 (*Hydrous*)
- aterimus* Eschscholtz, 1822: 128 E: AU BE BU BY CR CZ DE EN FI FR GE HU IT LA LT NL NT PL RO SK SV SZ
 UK "Caucasus" A: IN TM TR WS
africanus Kuwert, 1893b: 86 (*Hydrous*)
barbatus Letzner, 1884: 301
morio Sturm, 1835: 109
- bilineatus bilineatus* W.S. Macleay, 1825: 36 (*Hydrous*) A: FUJ "India" AUR ORR
brunnipalpis Kuwert, 1893b: 90 (*Hydrous*)
columbinus Kuwert, 1893b: 90 (*Hydrous*)
gayndahensis W.J. Macleay, 1873: 129
orientalis Kuwert, 1893b: 91 (*Hydrous*)
picicornis Chevrolat, 1863: 204 (*Hydroporus*)
resplendens Kuwert, 1893b: 91 (*Hydrous*)
ruficornis Boisduval, 1835: 151 [HN]
sabellifer Fairmaire, 1879a: 80
- bilineatus caschmirensis* Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 513 A: BT FUJ GUA GUX HAI HUB JA JIX KA SC SD
 SCH TAI XIZ YUN "Manchuria" ORR
birmanicus Régimbat, 1902a: 202 (*Stethoxus*)
japonicus Sharp, 1873b: 57
- cavisternum* Bedel, 1891a: 310 (*Stethoxus*) A: GUA HAI HKG ORR
- dauricus* Mannerheim, 1852a: 297 A: ES FE GAN HEI JA LIA NMO SHN
ganssuensis A.P. Semenov, 1889: 194
- hastatus* Herbst, 1779: 317 (*Dytiscus*) A: GUA HAI HKG YUN ZHE "India" ORR
aberrans Kuwert, 1893b: 93 (*Hydrous*)
- indicus* Bedel, 1891a: 310 (*Stethoxus*) A: NP SD UP
- mesopotamiae* Kniž, 1914: (115) (*Hydrous*) A: IQ
- olivaceus* Fabricius, 1781a: 289 A: NP SHG ORR
oblongus Olivier, 1793: 125
- piceus* Linnaeus, 1758: 411 (*Dytiscus*) E: AB AR AU AZ BE BH BU BY CR CZ DE FI FR GB GE GG GR HU IT LA
 LT LU MC MD ME NL NR PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG EG A: FE IS KA KZ LE SY TD TR WS XIN
angustior Rey, 1885b: 227

- niger* G. Eichler, 1876: 168 [HN]
plificifer Bedel, 1891a: 313 (*Stethoxus*)
ruficornis De Geer, 1774: 371 [RN]
turkestanus Kuwert, 1893b: 85 (*Hydrous*)
viridicollis Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 513
pistaceus Laporte, 1840b: 50 E: FR IT PT SP N: AG MO TU
inermis Lucas, 1846: 244
inermis Küster, 1852: no.56 [HN]
rufocinctus Bedel, 1891a: 309 (*Stethoxus*) A: SD UP
senegalensis Percheron, 1835: (no.4) 3 (*Hydrous*) N: AG EG A: PA SA UP YE AFR ORR
caffer Boheman, 1851: 594
convexus Laporte, 1840b: 50
paulinieri Guérin-Méneville, 1842: 73
piesbergeni Reitter, 1906c: 40 (*Hydrous*)
sternitalis Reitter, 1906c: 41 (*Hydrous*) A: HUN XIN
subgenus *Temnopterus* Solier, 1834: 302 type species *Temnopterus aculeatus* Solier, 1834
aculeatus Solier, 1834: 308 (*Temnopterus*) N: EG A: IN IS OM SA SY TR YE AFR
aegyptiacus Peyron, 1856a: 723
armatus Laporte, 1840b: 51
lugubris Motschulsky, 1845a: 31
spinipennis Gory, 1834: pl. 20 [fig. 14]

genus *Hydrophilus*, *nomina dubia* (possibly not Hydrophiloidea)

- ater* Gmelin, 1790: 1944 [DA] E: "Europa"
atricapillus Duftschmid, 1805: 243 [DA] E: AU
rufus Scopoli, 1763: 98 (*Dytiscus*) [DA] E: AU
tricolor Herbst, 1784: 122 [DA] E: GE

genus *Sternolophus* Solier, 1834: 302 type species *Sternolophus rufipes* Solier, 1834 (= *Sternolophus solieri* Laporte, 1840)

subgenus *Neasternolophus* Zaitzev, 1909: 229 type species *Hydrobius artensis* Montrouzier, 1860 (= *Hydrobius marginicollis* Hope, 1841)

inconspicuus Nietner, 1856: 15 (*Hydrous*) A: FUJ GUA GUX HKG JA MAC NP SD TAI YUN ORR
brachyacanthus Régimbart, 1902b: 472

subgenus *Sternolophus* Solier, 1834: 302 type species *Sternolophus rufipes* Solier, 1834 (= *Sternolophus solieri* Laporte, 1840)

Helobius Mulsant, 1851: 75 type species *Helobius noticollis* Mulsant, 1851 (= *Sternolophus solieri* Laporte, 1840)
decens Zaitzev, 1909: 231 A: IN OM SA YE ORR

rufipes Fabricius, 1792a: 183 (*Hydrophilus*) A: BEI FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JA JLA JIX KA NP SC SCH
SD SHA SHX TAI XIZ YUN ZHE ORR

fufipes Motschulsky, 1854: 45

- mergus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 514 (*Tropisternus*) [HN]
solieri Laporte, 1840b: 54 [RN] E: GR ITI N: AG EG A: IS SA YE AFR
graecus Baudi di Selve, 1864: 221 (*Hydrous*)
noticollis Mulsant, 1851: 75 (*Helobius*)
punctulatus L.W. Schaufuss, 1883b: cxc
rufipes Solier, 1834: 311 [HN]
unicolor Laporte, 1840: 54 A: YE (Suqutra) AFR
elongatus Schaufuss, 1883: cxc
frater Schaufuss, 1883: cxc

subfamily *Chaetarthriinae* Bedel, 1881tribe *Anacaenini* M. Hansen, 1991genus *Anacaena* Thomson, 1859: 18 type species *Hydrophilus globulus* Paykull, 1798

- Creniphilus* Motschulsky, 1845a: 549 [suppressed]
Enigmata M. Hansen, 1999b: 129 type species *Enigmata brunnea* M. Hansen, 1999
Grodum M. Hansen, 1999b: 124 type species *Grodum striatum* Hansen, 1999
Hebauerina Gentili, 2002: 141 type species *Hebauerina nanica* Gentili, 2002
Laccobiellus Abeille de Perrin, 1901: 60 type species *Hydrophilus globulus* Paykull, 1798
Metacymus Sharp, 1882: 65 type species *Metacymus parvulus* Sharp, 1882
Omnioops Perkins & Short, 2004: 2 type species *Omnioops fasciatus* Perkins & Short, 2004 (= *Anacaena praetexta* (Gentili, 1996))
Paranacaena Blackburn, 1888b: 820 type species *Paracymus lindi* Blackburn, 1888
asahinai Satô, 1982: 385 A: FE JA
atriflava Jia, 1997a: 108 A: ANH FUJ GUA GUI JIX ZHE
bipustulata Marsham, 1802: 406 (*Hydrophilus*) E: BE BU CR CZ FR GB GE IT LU NL PL PT RO SK SP SZ UK N:
 AG MO TU
kiesenwetteri Reitter, 1872: 178 (*Laccobius*)
similis Laporte, 1840b: 57 (*Brachypalpus*)
brachypenis Komarek, 2012: 248 A: YUN
bulbifera Pu, 1964: 400 (397) A: GUA GUI HUN
bushiki Pu, 1963: 82 (79) A: HUN YUN
conglobata Wollaston, 1854: 97 (*Hydrobius*) N: MR
gaoligongshana Komarek, 2012: 251 A: YUN
gaetanae Bameul, 2001: 226 E: FR (Corse)
gerula d'Orchymont, 1942e: 54 A: GUI YUN
globulus Paykull, 1798: 188 (*Hydrophilus*) E: AL AN AU BE BY CZ DE EN FA FI FR GB GE IR IT LA LU ME NL:
 NR PL PT SK SP SV SZ UK N: AG MO TU A: TR
altabroix Laporte, 1840b: 58 (*Coelostoma*) [DA]
elliptica Sainte-Claire Deville, 1914: 532
glabricollis L.W. Schaufuss, 1869: 11 (*Hydrobius*)
nitidior Kuwert, 1890a: 69
haemorrhoea Wollaston, 1864: 92 (*Hydrobius*) N: CI

- hainanensis* Jia, 1997a: 109 A: HAJ
jaegeri Komarek, 2006: 289 A: NP
jengi Komarek, 2011: 230 A: TAI
jiafenglongi Komarek, 2012: 255 A: YUN
laevis d'Orchymont, 1936d: 257 A: NP UP
laevoides Komarek, 2006: 294 A: UP
lancifera Pu, 1963: 81 (78) A: ANH FUJ GUA HUN JIX SCH YUN
lanzhuji Komarek, 2012: 258 A: HAI
limbata Fabricius, 1792a: 82 (*Sphaeridium*) E: AL AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT
 LA LU ME NL NT PI. PT RO SK SP ST SV SZ UK YU N: AG A: FE IS KZ SY TR WS NARI
carinata Thomson, 1870a: 126
foveolata Haworth, 1807: 86 (*Hydrophilus*)
ochracea Stephens, 1829c: 134 (*Hydrobius*) [DA]
lohsei Berge Henegouwen & Hebauer, 1989: 273 E: AU IT SZ
lushanensis Pu, 1964: 400 (398) A: JIX
lutescens Stephens, 1829c: 134 (*Hydrobius*) E: AR AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR IT
 LA LT LU MA MC MD NL NR NT PL PT RO RU SP ST SV SZ UK YU N: AG EG MO TU A: FE KZ TR UZ WS
 XIN NAR
ambigua Rey, 1885a: 13 (*Brachypalpus*)
castanea LeConte, 1878b: 597 (*Hydrobius*) [DA]
feminalis LeConte, 1878b: 597 (*Hydrobius*) [DA]
immatura Abeille de Perrin, 1901: 59
infuscata Motschulsky, 1859a: 177 (*Brachypalpus*) [DA]
marshami Stephens, 1839: 92 (*Laccobius*) [RN]
nitida Heer, 1841: 485 (*Hydrobius*)
ovata Reiche, 1861: 203 (*Hydrobius*) [DA]
praecox Dufour, 1843: 58 (*Hydrobius*) [DA]
sordens Stephens, 1829c: 134 (*Hydrobius*)
variabilis Sharp, 1870b: 255
maculata Pu, 1964: 400 (399) A: FUJ GUA GUI GUX HUN JIX YUN
pseudoyunnanensis Jia, 1997a: 110
marchantiae Wollaston, 1857: 31 (*Hydrobius*) N: MR
pui Komarek, 2012: 261 A: GUI HUB JIX SICH YUN
rufipes Guillebeau, 1896b: 226 (*Paracymus*) E: BH GR IT YU TR A: IS LE SY TR
jordanensis Burmeister, 1985: 44
schoenmanni Komarek, 2012: 263 A: YUN
sichuana Komarek, 2012: 264 A: SCH
smetanai Komarek, 2011: 232 A: TAI
taurica Ryndevich, 2000: 123 E: AR GG ST UK (Krym) A: KZ
wangi Komarek, 2012: 266 A: GUX HUB SCH
yunnanensis d'Orchymont, 1942e: 49 A: GUX HUN YUN
hunanensis Pu, 1964: 400 (397)

- genus *Crenitis* Bedel, 1881: 306 type species *Hydrobius punctatostriatus* Letzner, 1840
 subgenus *Acrenitis* Matsui & Nakane, 1985: 91 type species *Crenitis osawai* Nakane, 1966
formosana Hebauer, 1994: 20 A: TAI
nakanei Hebauer, 1994: 24 A: JA
neglecta Matsui & Nakane, 1985: 90 A: JA
osawai Nakane, 1966: 55 A: JA TAI
primorica Hebauer, 1994: 27 A: FE LIA
satoi Hebauer, 1994: 29 A: JA TAI
tokarana Nakane, 1966: 56 A: JA
 subgenus *Crenitis* Bedel, 1881: 306 type species *Hydrobius punctatostriatus*
 Letzner, 1840
Aparacymus Matsui & Nakane, 1985: 91 type species *Anacaena japonica* Nakane, 1963
Creniphilus Horn, 1890a: 267 type species *Hydrobius rufiventris* Horn, 1873
Noxonus d'Orchymont, 1925a: 164 type species *Crenitis zimmermanni* Knisch, 1924
apicalis Reitter, 1896d: 285 (*Paracymus*) A: ES FE HEI JA JIL LIA NMO SCH
protuberans Jia, 1996: 96
convexa Ji & Komarek, 2003: 402 A: NO SHX SW
cordula Hebauer, 1994: 18 A: NP YUN
hokkaidensis Nakane, 1966: 57 (*Anacaena*) A: JA
japonica Nakane, 1963c: 65 (*Anacaena*) A: JA
karyukovae Shatrovskiy, 1989: 289 A: FE
nepalensis Hebauer, 1994: 25 A: NP
orientalis Satô, 1979: 54 A: BT NP SD
punctatostriata Letzner, 1840: 81 (*Hydrobius*) E: AU BE CZ GE PL SK SZ
rufula Hebauer, 1994: 29 A: NP
shaanxiensis Ji & Komarek, 2003: 408 A: NO

tribe Chaetarthriini Bedel, 1881

- genus *Chaetarthria* Stephens, 1835: 401 type species *Hydrophilus seminulum* Herbst, 1797
Cyllidium Erichson, 1837: 211 type species *Hydrophilus seminulum* Herbst, 1797
almorana Knisch, 1924b: 39 A: UP ORR
indica d'Orchymont, 1920: 19 A: GUX HKG NP SD ORR
saundersi d'Orchymont, 1923b: 420 A: NP ORR
seminulum Herbst, 1797: 314 (*Hydrophilus*) E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU
 MC NL NR NT PL PT SK SL SP SV SZ UK YU "Caucasus" N: TU A: IN TR "Siberia"
carbonaria Sturm, 1807: 61 (*Agathidium*) [DA]
picea Hlochhuth, 1871: 246
seminulum Paykull, 1798: 190 (*Hydrophilus*) [HN]
sithonica Hebauer, 1993: 1
simillima Vorst & Cuppen, 2003: 164 E: AU BE CZ FR GB GE IR NL SP
similis Wollaston, 1864: 93 E: FR GE IT SP SZ N: CI EG MO A: IS

genus *Hemisphaera* Pandellé, 1876: 57 type species *Hemisphaera infima* Pandellé, 1876 (= *Hydrobius seriato-punctatus* Perris, 1874)

guignoti Schaefer, 1975: 130 E: FR SP

mitiadis J. Sahlberg, 1908: 23 E: GR

orientalis Jia, Fikáček & Song, 2013 A: GUX

seriatopunctata Perris, 1874: 2 (*Hydrobius*) E: FR IT SP

infima Pandellé, 1876: 58

socotrana Fikáček, Delgado & Gentili, 2012: 119 A: YE (Suqutra)

genus *Thysanarthria* d'Orchymont, 1926b: 242 type species *Hydrobius atriceps* Régimbart, 1903

Chaetarthriomorphus Chiesa, 1967: 276 type species *Chaetarthriomorphus sulcatus* Chiesa, 1967

brittoni Balfour-Browne, 1951: 215 A: YE

championi Knisch, 1924b: 40 (*Chaetarthria*) A: UP

madurensis Hebauer, 2001: 298 A: NP ORR

sulcata Chiesa, 1967: 276 (*Chaetarthriomorphus*) A: AF OM

subfamily Enochrinae Short & Fikáček, 2013

genus *Cymbiodyta* Bedel, 1881: 307 type species *Hydrophilus marginellus* Fabricius, 1792

Cymbula Pandellé, 1876: 58 [HN] type species *Philhydrus ovalis* Thomson, 1853 (= *Hydrophilus marginellus* Fabricius, 1792)

Hydrocombustus Sharp, 1882: 70 type species *Hydrocombustus brevicollis* Sharp, 1882

marginella Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA

LT LU ME NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK A: ES KZ NP TR UZ WS

carbonarius Kuwert, 1892d: 364 (*Philhydrus*)

marginatus Duftschmid, 1805: 241 (*Hydrophilus*)

margipallens Marsham, 1802: 408 (*Hydrophilus*)

ovalis Thomson, 1853: 52 (*Philhydrus*)

testacea Spicser, 1893: 13

orientalis Jia & Short, 2011a: 348 A: GUA JIX

genus *Enochrus* Thomson, 1859: 18 type species *Hydrophilus bicolor* sensu Gyllenhal, 1808 (= *Hydrophilus melanocephalus* Olivier, 1793)

subgenus *Enochrus* Thomson, 1859: 18 type species *Hydrophilus bicolor* sensu Gyllenhal, 1808 (= *Hydrophilus melanocephalus* Olivier, 1793)

melanocephalus Olivier, 1793: 127 (*Hydrophilus*) E: AR AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT

LA LT LU NL NR NT PL PT SK SP SV SZ UK YU N: AG A: AF ES FE IS KZ NMO 'R

atricapillus Stephens, 1829c: 131 (*Hydrobius*)

italus Kuwert, 1890a: 62

subgenus *Holcophilydrus* Kniž, 1912: (168) type species *Holcophilydrus ussuriensis* Kniž, 1912

hybridus Hebauer, 2005: 53 A: HUB

laoticus Hebauer, 2005: 52 A: YUN ORR

parumstriatus Hebauer, 2005: 52 A: TAJ

- simulans* Sharp, 1873b: 59 (*Philydrus*) A: FE JA SC TAI BEI HEB HEI HUB JIL LIA NMO SCH SHA SHG SHX
TIA "Manchuria"
- crenatostratus* H. Kolbe, 1886: 179 (*Philydrus*)
- kishidai* Kamiya, 1935: 4
- umbratus* Sharp, 1884b: 454 (*Philydrus*)
- ussuriensis* Kniž, 1912: (168)
- subgenus *Hydatotrephis* W.S. Macleay, 1873: 129 type species *Hydatotrephis mastersi* W.S. Macleay, 1873
- liangji* Jia & Zhao, 2007: 252 A: GUI JIX SCH
- subgenus *Lumetus* Zaitzev, 1908b: 385 [RN] type species *Hydrophilus melanocephalus* sensu Fabricius, 1801 (= *Philydrus fuscipennis* Thomson, 1884)
- Philydrus* Solier, 1834: 302 [HN] type species *Hydrophilus melanocephalus* sensu Fabricius, 1801 (= *Philydrus fuscipennis* Thomson, 1884)
- Pseudenocheirus* Łomnicki, 1911: 266 type species *Hydrobius frontalis* Erichson, 1837 (= *Hydrophilus ochropterus* Marsham, 1802)
- asiaticus* Kuwert, 1893a: 17 (*Philydrus*) A: IN KZ TM GAN SHX
- ater* Kuwert, 1888e: 289 (279) (*Philydrus*) E: AU BII CR FR GR IT RO SP YU N: AG EG A: CY IN IQ IS JO KU KZ
LE OM SA SY TD TM TR UZ XIN
- bicolor* Fabricius, 1792a: 184 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT
LA LT MA ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV UK N: AG CI EG MO TU A: ES FE JA KZ MG NMO NP
TD TM TR UZ WS XIN
- atricornis* Kuwert, 1888e: 286 (276) (*Philydrus*)
- chrysomelinus* Fabricius, 1787: 192 (*Dytiscus*) [HN]
- ferrugineus* Küster, 1849b: no.10 (*Hydrobius*) [HN]
- flavus* Kuwert, 1890a: 43 (*Philydrus*)
- fulvus* Marsham, 1802: 408 (*Hydrophilus*) [HN]
- griseus* Gyllenhal, 1827: 276 (*Hydrophilus*)
- labiatus* Rey, 1885b: 258 (*Philydrus*) [DA]
- levanderi* J. Sahlberg, 1892: 225 (*Philydrus*) [RN]
- maritimus* Thomson, 1853: 51 (*Philydrus*)
- mediterraneus* J. Sahlberg, 1900b: 185 (*Philydrus*)
- rubicundus* Kuwert, 1888e: 275 (*Philydrus*)
- sahlbergi* Kuwert, 1888e: 286 (276) (*Philydrus*) [HN]
- sternospina* Kuwert, 1888e: 288 (277) (*Philydrus*)
- torquatus* Marsham, 1802: 405 (*Hydrophilus*) [DA]
- unguidebilis* Kuwert, 1888e: 287 (276) (*Philydrus*)
- yukinoae* Matsui, 1994: 218
- blazquezae* Arribas & Millán, 2013: 192 N: MO
- calabricus* Ferro, 1986c: 433 (*Philydrus*) E: IT
- concii* Chiesa, 1965: 55 E: IT
- convexius* Sató, 1977: 198 [DA] A: BT NP

- falcarius* Hebauer, 1991a: 84 E: IT (Sicilia)
- ferrugineus* Motschulsky, 1849: 79 (*Philhydrus*) [DA] A: ES
- fuscipennis* Thomson, 1884a: 1031 (*Philhydrus*) E: AB AR AU BH BU CT CZ DE FI GB GE HU IR IT LA LU NR NT
PL PT SL SP ST SV UK N: TU A: ES HEI IN KI KZ NMO TR WS XIN
- berolinensis* Kuwert, 1888e: 278 (*Philhydrus*)
- caspius* Kuwert, 1888e: 282 (275) (*Philhydrus*)
- fasciatus* Kuwert, 1888e: 278 (*Philhydrus*)
- sahlbergi* Fauvel, 1887: 86 (*Philhydrus*) [RN]
- similis* Kuwert, 1888e: 278 (*Philhydrus*)
- halophilus* Bedel, 1878b: clxix (*Philhydrus*) E: DE FR GB GE IR IT NL SP ST SV UK A: CY TR
- brevipalpis* Sharp, 1914a: 83 (*Philhydrus*) [DA]
- salinus* Kuwert, 1888e: 279 (*Philhydrus*)
- hamifer* Ganglbauer, 1901a: 332 (*Philhydrus*) E: AU CZ GE HU ST UK YU A: IS KI KZ TM UZ
- caspius* d'Orchymont, 1933a: 308
- hispanicus* Kuwert, 1888e: 281 (275) (*Philhydrus*) E: PT SP
- jesusarribasi* Arribas & Millán, 2013: 191 E: SP
- ochropterus* Marsham, 1802: 409 (*Hydrophilus*) E: AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT NL
NR NT PL PT RO SK SP SV SZ A: ES TR WS
- frontalis* Erichson, 1837: 210 (*Hydrobius*)
- nigricans* Zetterstedt, 1838: 123 (*Hydrophilus*)
- politus* Küster, 1849b: no.9 (*Hydrobius*) E: CR IT PT SP N: AG CI EG MO MR TU A: AF CY IS LE OM SY TR
- agrigeninus* Rottenberg, 1870: 22 (*Philhydrus*)
- atlanticus* C.É. Blanchard, 1853: 51 (*Philhydrus*)
- cosyrensis* Rey, 1885b: 260 (*Philhydrus*)
- sahariensis* Fairmaire, 1879b: 160 (*Philhydrus*)
- quadrinotatus* Guillebeau, 1896b: 226 (*Philhydrus*) A: "Syria"
- quadripunctatus* Herbst, 1797: 305 (*Hydrophilus*) E: AL AU AZ BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR
HU IT LA LT LU ME NL NR NT PL SK SL SP SV UK A: ES FE HEI IN IS KI KZ NMO TD TR XIN WS
- dichrous* Krynicki, 1832: 116 (*Hydrophilus*) [DA]
- frontalis* Dalla Torre, 1877: 68 (*Philhydrus*) [HN]
- fulvipennis* Rey, 1885b: 262 (*Philhydrus*) [HN]
- marginatus* Gozls, 1916: 42 (*Philhydrus*)
- rectus* J. Sahlberg, 1875: 216 (*Philhydrus*)
- ytenensis* Sharp, 1915f: 323 (*Philhydrus*)
- risii* Arribas & Millán, 2013: 193 N: MO TU
- salomonis* J. Sahlberg, 1900b: 187 (*Philhydrus*) E: SP A: AF IN IS JO TR
- segmentinotatus* Kuwert, 1888e: 284 (276) (*Philhydrus*) E: AL BU CR FR GR IT ME PT RO SL SP ST YU N: AG EG
LB TU A: CY ES FE IN IQ IS JO KU KZ MG SA TD TM TR UZ AFR
- apicinotus* Kuwert, 1888e: 285 (276) (*Philhydrus*)
- maculicapex* Kuwert, 1888e: 284 (276) (*Philhydrus*)

- transcaspicus* J. Sahlberg, 1900b: 185 (*Philhydrus*)
vultur Kuwert, 1888e: 283 (276) (*Philhydrus*)
sinuatus d'Orchymont, 1937c: 38 A: IN KU PA
subsignatus Harold, 1877: 342 (*Philhydrus*) A: BEI CHQ HUB HUN FUJ GUA JA JIA SHA SHG SC TAI
testaceus Fabricius, 1801a: 252 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT
 LA LT LU NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK YU N: TU A: ES FE JA KZ TR WS XIN
lederi Kuwert, 1888e: 289 (277) (*Philhydrus*) [DA]
lineatus Kuwert, 1888e: 275 (*Philhydrus*)
maculicollis Dalla Torre, 1877: 68 (*Philhydrus*)
turanicus Schödl, 1998: 123 A: IN TM
 subgenus *Methhydrus* Rey, 1885b: 253 type species *Hydrophilus affinis* Thunberg, 1794
Agraphhydrus Kuwert, 1888e: 280 type species *Hydrophilus affinis* Thunberg, 1794
Gemelus García, 2000: 223 type species *Gemelus pallidus* García, 2000
affinis Thunberg, 1794b: 73 (*Hydrophilus*) E: AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE IR IT LA LI
 NL NR NT PL SK ST SV SZ UK A: ES FE HEI JA NMO KZ WS
vilis Sharp, 1884b: 453 (*Philhydrus*)
amurensis Hebauer, 1995b: 32 A: FE
circumductus Régimbart, 1905: 213 (*Philhydrus*) A: YE AFR
coarctatus Gredler, 1863a: 75 (*Philhydrus*) E: AU BE BH BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LI
 NL NR NT PL SK SV SZ A: FE TR WS
fulvipennis Westhoff, 1881: 57 (*Philhydrus*)
suturalis Sharp, 1872: 153 (*Philhydrus*)
crassus Régimbart, 1903b: 55 (*Philhydrus*) A: JIX ORR
esuriens Walker, 1858: 209 (*Philhydrus*) A: BT CHQ FUJ GUA GUX HAI HUB HUN IQ JA JIA JIX NP PA SA SC
 SCH YUN "India" AUR ORR
nigriceps Motschulsky, 1860a: 46 (*Pylophilus*)
nigriceps L. Redtenbacher, 1868: 26 (*Philhydrus*) [HN]
ornaticeps Sharp, 1884b: 454 (*Philhydrus*)
pullus Fauvel, 1883b: 354 (*Philhydrus*)
flavicans Régimbart, 1903b: 56 (*Philhydrus*) A: FUJ GUA HUB HUN JIA TAI YUN ORR
fragilis Sharp, 1890: 350 (*Philhydrus*) A: CHQ YUN ORR
fretus d'Orchymont, 1932c: 703 A: YUN ORR
haroldi Sharp, 1884b: 452 (*Philhydrus*) A: JA ORR
hesperidum Sharp, 1870a: 16 (*Philhydrus*) E: AB A: IS SA YE AFR
nitidulus Kuwert, 1888e: 290 (280) (*Philhydrus*)
reductus Régimbart, 1905: 215 (*Philhydrus*)
icterus Knisch, 1924b: 38 A: UP ORR
iteratus Sharp, 1890: 349 (*Philhydrus*) A: FE ORR
japonicus Sharp, 1873b: 59 (*Philhydrus*) A: FE GUA HEI JA JIA JIX ZHE ORR
latus Kuwert, 1888e: 291 (280) (*Philhydrus*) N: EG A: IN SA

- mesopotamiae* Kuwert, 1890a: 60 (*Philydrus*) A: IN IQ IS
morenae L. Heyden, 1870: 67 (*Hydrobius*) E: FR PT SP
natalensis Gemminger & Harold, 1868: 480 (*Hydrobius*) [RN] E: IT PT SP N: EG A: SY "India" AFR AUR ORR
assimilis Boheman, 1851: 600 (*Hydrobius*) [HN]
pumilio Sharp, 1904: 8 (*Philydrus*)
nigropiceus Motschulsky, 1861: 109 (*Philhydrus*) A: NP ORR
cheesmanae Balfour-Browne, 1939b: 475
rubrocinctus Régimbart, 1903b: 56
nigritus Sharp, 1873c: 262 (*Philhydrus*) E: AB AL AR BE BU CR FR GB GR IT LU MC ME NL PT RO SP ST TR UK
 YU N: MO TU A: IN KZ TR
isotae Hebauer, 1981: 137
nitiduloides Kuwert, 1888e: 291 (280) (*Philydrus*) N: EG
pseudedurians Jia & Wang, 2010: 377 A: HAI
puetzi Hebauer, 1995b: 32 A: FE
ragusae Kuwert, 1888a: 38 (*Philydrus*) E: IT
satomii Nakane & Matsui, 1986a: 78 A: JA
sauteri d'Orchymont, 1913: 6 A: TAI
schawalleri Hebauer, 1991b: 178 A: TD XIN
tetruspilus Régimbart, 1903c: 335 (*Philhydrus*) A: BT NP TR YE AFR ORR
uniformis Sharp, 1884b: 453 (*Philydrus*) A: FE JA SC
 genus *Enochrus*, species *incertae sedis*
algarum Jia & Short, 2013: 610 A: FUJ
- genus *Notionotus* Spangler, 1972: 139 type species *Notionotus rosalesi* Spangler, 1972
attenuatus Jia & Short, 2013b: 55 A: GUA
fenestratus Hebauer, 2001: 10 A: YUN
notaticollis Hebauer, 2001: 11 A: HAI YUN
siktisi Hebauer, 2001: 12 A: NP

subfamily **Acidocerinae** Zaitzev, 1908

- genus *Agraphydrus* Régimbart, 1903a: 33 type species *Agraphydrus punctatellus* Régimbart, 1903
 subgenus *Agraphydrus* Régimbart, 1903a: 33 type species *Agraphydrus punctatellus* Régimbart, 1903
Pseudohelochares Satô, 1960: 76 type species *Pseudohelochares narusei* Satô, 1960
Pseudopelthydrus Jia, 1998: 225 type species *Pseudopelthydrus longipalpus* Jia, 1998
ishiharai Matsui, 1994: 215 (*Enochrus*) A: JA
kempi d'Orchymont, 1922: 626 (*Helochares*) A: AP NP UP
longipalpus Jia, 1998: 229 (*Pseudopelthydrus*) A: HAI
minutissimus Kuwert, 1890a: 37 (*Helochares*) A: OM SA SY YE
narusei Satô, 1960: 77 (*Pseudohelochares*) A: JA
orientalis d'Orchymont, 1932c: 690 (*Helochares*) A: TAI YUN ORR
pauculus Knisch, 1924b: 36 (*Helochares*) A: NP UP

pygmaeus Knisch, 1924b: 38 (*Helochares*) A: UP
ryukyuensis Matsui, 1994: 217 (*Enochrus*) A: TAI JA
stagnalis d'Orchymont, 1937c: 37 (*Helochares*) A: NP PA UP
 subgenus *Gymnelochares* d'Orchymont, 1932c: 692 type species *Helochares geminus* d'Orchymont, 1932
indicus d'Orchymont, 1932c: 694 A: NP UP

genus *Chasmogenus* Sharp, 1882: 73 type species *Chasmogenus fragilis* Sharp, 1882

Crephelochares Kuwert, 1890a: 38 type species *Helochares livornicus* Kuwert, 1890
abnormalis Sharp, 1890: 351 (*Philydrus*) A: JA TAI ORR
ferrugatus Régimbart, 1903b: 57 (*Philydrus*)
nigritulus Régimbart, 1903b: 57 (*Philydrus*) [HN]
regimbarti Knisch, 1924a: 195 [RN]
livornicus Kuwert, 1890a: 38 (*Helochares*) E: BH CR GR IT SP YU A: IS TR TU
orbis N. Watanabe, 1987: 12 (*Helochares*) A: JA

genus *Helochares* Mulsant, 1844a: 197 [RN] type species *Dytiscus lividus* Forster, 1771

subgenus *Helochares* Mulsant, 1844a: 197 [RN] type species *Dytiscus lividus* Forster, 1771

Enhydrus W.S. Macleay, 1825: 35 [suppressed]
Neohydrobius Blackburn, 1898: 221 type species *Philydrus burruendiensis* Blackburn, 1890 (= *Stagnicola foveicollis* Montrouzier, 1860)
Peloxenus Motschulsky, 1845a: 549 [RN] type species *Hydrophilus griseus* Fabricius, 1787 (= *Dytiscus lividus* Forster, 1771)
Pylophilus Motschulsky, 1845a: 32 type species *Hydrophilus griseus* Fabricius, 1787 (= *Dytiscus lividus* Forster, 1771)
Stagnicola Montrouzier, 1860: 246 [HN] type species *Stagnicola foveicollis* Montrouzier, 1860
atropiceus Régimbart, 1903b: 53 A: GUA GUX HKG JA JIX NP ORR
ohkurai Satô, 1976: 21
dilutus Erichson, 1843: 228 (*Hydrobius*) A: YE (Suqutra) AFR

niloticus Sharp, 1904: 7

lividoides M. Hansen & Hebauer, 1988: 27 A: IS TR

lividus Forster, 1771: 52 (*Dytiscus*) E: AU BH BU BY CR CZ FR GB GE GR HU IT LU MC NL PL PT SL SP SZ UK
 YU N: AG CI MO TU A: SY TR

fulvus Geoffroy, 1785: 65 (*Hydrophilus*)
chrysolinus Herbst, 1797: 313 (*Hydrophilus*) [HN] [DA]
griseus Fabricius, 1787: 189 (*Hydrophilus*)
lividus Herbst, 1797: 316 (*Hydrophilus*) [HN]
ludovici L.W. Schaufuss, 1869: 11
pallidetaceus Stierlin, 1900: 219
pallidus P. Rossi, 1792: 66 (*Hydrophilus*)

longipalpis Murray, 1859: 123 (*Philydrus*) N: EG A: IS AFR

filipalpis Sharp, 1904: 6

nigritulus Kuwert, 1889: 8 E: IT

obliquus Mart, İncekara & Karaca, 2010: 299 A: TR

- obscurus* O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*) E: AB AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IT LA LT
LU ME NI. NR NT PL SK ST SV SZ UK A: IN IS KZ TR WS XIN
- erythrocephalus* Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*)
- subcompressus* Rey, 1885a: 14
- substriatus* J. Sahlberg, 1903b: 20
- variegatus* Herbst, 1797: 304 (*Hydrophilus*)
- pallens* W.S. Macleay, 1825: 35 (*Enhydrus*) N: EG A: FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN IS JA JIX LE NP SA SCH
SHA TR YE YUN "India" AFR AUR ORR
- dispar* Sharp, 1904: 7
- laeviusculus* Régimbart, 1906: 261
- lewisius* Sharp, 1873b: 60
- parvulus* Reiche & Saulcy, 1856: 359
- parvulus* Guillebeau, 1896b: 226 (*Philhydrus*) [HN] [DA]
- punctatus* Sharp, 1869: 241 E: BY CT DE FR GB GE HU IR LT LU NL PT SP ST UK A: TR
- subgenus** *Helocharimorphus* Kuwert, 1890a: 62 (and 1890b: 306) type species *Helocharimorphus sharpi*
Kuwert, 1890
- sharpi* Kuwert, 1890a: 63 (*Helocharimorphus*) N: EG A: IS AFR
- subgenus** *Hydrobaticus* W.J. Macleay, 1873: 131 type species *Hydrobaticus tristis* W.J. Macleay, 1873
- Graphelochares* Kuwert, 1890a: 38 type species *Helophilus melanophthalmus* Mulsant, 1844
- anchoralis* Sharp, 1890: 352 A: FUJ GUA HAI HUB JA NP TAI YUN "India" ORR
- andreinii* d'Orchymont, 1939b: 320 A: OM SA YE AFR
- crenatuloides* d'Orchymont, 1943a: 2 A: OM UP ORR
- crenatus* Régimbart, 1903b: 54 A: YUN ORR
- densus* Sharp, 1890: 352 A: GUA HAI NP UP ORR
- lentus* Sharp, 1890: 352 A: GUA NP TAI XIZ YUN "India" ORR
- mentinotus* Kuwert, 1888e: 292 N: EG A: IS AFR
- squalidus* Sharp, 1904: 7
- neglectus* Hope, 1845: 16 (*Hydrobius*) A: FUJ GUA GUX HUB HUN JIX YUN ZHE ORR
- negatus* Hebauer, 1995a: 5 A: NP ORR
- nipponicus* Hebauer, 1995a: 6 [RN] A: JA SC
- striatus* Sharp, 1873b: 60 [HN]
- sauteri* d'Orchymont, 1943a: 6 A: GUA GUI HUB JIX SCH TAI
- uenoi* Matsui, 1995: 317 A: JA
- genus** *Horelophopsis* M. Hansen, 1997: 109 type species *Horelophopsis avita* M. Hansen, 1997
- hanseni* Satô & Yoshitomi, 2004: 42 A: JA
- genus** *Megagraphydrus* M. Hansen, 1999b: 137 type species *Megagraphydrus siamensis* M. Hansen, 1999
- anhuianus* Hebauer, 2000: 15 A: AHN
- luteimarginalis* Minoshima & Fujiwara, 2009: 55 A: JA
- politus* M. Hansen, 1999b: 138 A: TAI

puzhelongi Jia, 2010: 65 A: CE

wangi Hebauer, 2000: 15 A: TAI

subfamily Sphaeridiinae Latreille, 1802

tribe Coelostomatini L. Heyden, 1891

genus *Coelostoma* Brullé, 1835: 293 type species *Hydrophilus orbicularis* Fabricius, 1775

subgenus *Coelostoma* Brullé, 1835: 293 type species *Hydrophilus orbicularis* Fabricius, 1775

Cyclonotum Erichson, 1837: 212 type species *Hydrophilus orbicularis* Fabricius, 1775

fallaciosum d'Orchymont, 1936a: 19 A: FUJ GUA HKG NP TAI YUN ORR

hispanicum Küster, 1848a: no. 39 (*Cyclonotum*) E: AL FR GR IT PT SP N: CI MO TU

maroccanum Kuwert, 1890b: 176

montanum Mouchamps, 1958: 28 A: NP UP

orbiculare Fabricius, 1775: 229 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR
IT I.A LT LU ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: BEI ES FE HEB HEN JA KZ TR WS

breve Sharp, 1874e: 419 (*Cyclonotum*)

brevitarse L. Heyden, 1870: 74 (*Cyclonotum*)

dalmatinum Küster, 1848a: no. 40 (*Cyclonotum*)

graecum Kuwert, 1890b: 178

immaculatum F. Rossi, 1790: 48 (*Sphaeridium*)

minus Sharp, 1873c: 262 (*Cyclonotum*)

pilula O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*)

punctatum Goeze, 1777: 616 (*Dytiscus*) [RN]

puncticolle Reitter, 1906b: 32

subaereum Reitter, 1906b: 32

sulcatum Pu, 1963: 81 A: XIZ YUN

syriacum d'Orchymont, 1936a: 9 A: IS SY

vitalisi d'Orchymont, 1923b: 418 A: GUA GUX HAI HKG SHN YUN ORR

vividum d'Orchymont, 1936a: GUA ORR

subgenus *Holocoelostoma* Mouchamps, 1958: 3 type species *Hydrobius stultus* Walker, 1858

bhutanicum Jayaswal, 1972: 409 A: BT NP UP

stultum Walker, 1858: 209 (*Hydrobius*) A: AE AF CHQ FUJ GUA GUX HUN JA JIX SCH NP OM SA SC SCH TAI
XIZ YE YUN AFR ORR

simplex Sharp, 1874e: 419 (*Cyclonotum*)

sulcatum Pu, 1963: 81

subgenus *Lachnocoelostoma* Mouchamps, 1958: 4 type species *Cyclonotum horni* Régimbart, 1902

bifidum Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: GUA GUX JIX HKG

bipunctatum Jayaswal, 1972: 410 A: AP NP UP

coomani d'Orchymont, 1932c: GUX YUN ORR

gentilii Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: XIZ

hajeki Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: GUA GUX

himalayanum Hebauer, 2002a: 29 A: NP

- hongkongense* Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: HKG
- horni* Régimbart, 1902b: 474 (*Cyclonotum*) A: BT NP OM SA YE YUN "India" AFR ORR
- huanqi* Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: GUX JIX
- martensi* Hebauer, 2002a: 29 A: NP
- medianum* Hebauer, 2002a: 30 A: NP
- phallicum* d'Orchymont, 1940f: 158 A: GUA GUX HAI HUN JIX SN XIN ORR
- rubens* Hebauer, 2002a: 31 A: NP
- surkhetensis* Hebauer, 2002a: 32 A: NP
- transcaspicum* Reitter, 1906b: 32 A: IN OM SA SHN TM UZ TD TR ORR
- turnai* Hebauer, 2006: 15 A: HUB HUN
- vagum* d'Orchymont, 1940f: 159 A: ANH SHN YUN ORR
- wui* d'Orchymont, 1940f: 160 A: HUB HUN JIX SHA SHN XIN "Korea"
- genus *Dactylosternum* Wollaston, 1854: 99 type species *Dactylosternum roussetii* Wollaston, 1854
(= *Sphaeridium abdominale* Fabricius, 1792)
- Macrocercyon* Alluaud, 1899: 379 [RN] type species *Trichopoda cassidaeformis* Brullé, 1835
- Trichopoda* Brullé, 1835: 294 [HN] type species *Trichopoda cassidaeformis* Brullé, 1835
- abdominale* Fabricius, 1792a: 79 (*Sphaeridium*) Ei: AZ CR CZ FR GB GE GR IT SP SZ Ni: AG CI EG MR TU Ai:
AE CY GUA JA SY YF "India" AFR AURi NARi NTRi ORRi
- foveonitidum* Kuwert, 1890b: 179
- insulare* Laporte, 1840b: 59 (*Coelostoma*)
- mulsanti* Murray, 1859: 35a (*Cyclonotum*)
- natalense* Gemminger & Harold, 1868: 495 (*Cyclonotum*) [RN]
- nitidum* Boheman, 1851: 602 (*Cyclonotum*) [HN]
- perezdearcei* Moroni, 2000: 23 (*Andotypus*)
- roussetii* Wollaston, 1854: 100
- semistriatum* L.W. Schaufuss, 1887: 108 (*Hydrobius*)
- arabicum* Balfour-Browne, 1951: 205 N: EG A: YE
- hydrophiloides* W.S. Macleay, 1825: 36 (*Sphaeridium*) A: BT FUJ GUA GUI GUX HAI NP SD TAI YUN AFRi AURi
NTRi ORR
- capense* Mulsant, 1844b: 170 (*Cyclonotum*)
- nitidum* Laporte, 1840b: 58 (*Coelostoma*)
- rubripes* Boheman, 1858: 24 (*Cyclonotum*)
- latum* Sharp, 1873b: 64 (*Cyclonotum*) A: JA
- pui* Jia, 2002: 75 A: GUX
- vitalisi* d'Orchymont, 1925c: 271 A: FUJ HAI JIX YUN ORR
- tribe Megasternini Mulsant, 1844
- genus *Armostus* Sharp, 1890: 358 type species *Armostus optatus* Sharp, 1890
- amplevatus* Jia, 1995: 130 (*Cercyon*) A: GUA HUUN
- caudatus* Hebauer, 2002a: 37 A: NP

crenulatus Régimbart, 1903c: 337 (*Cercyon*) A: JA NP UP ORR

cuneatus Hebauer, 2002a: 37 A: NP

nigricans Hoshina & Satô, 2006: 97 A: JA SC

ohyamatsensis Hoshina & Satô, 2006: 102 A: JA

optatus Sharp, 1890: 359 A: UP ORR

schenklingi d'Orchymont, 1914: 323 (*Cercyon*) A: GUA HKG MAC TAI ORR

genus *Cercyon* Leach, 1817: 95 type species *Dermestes melanocephalus* Linnaeus, 1758

subgenus *Acycreon* d'Orchymont, 1942a: 3 type species *Cercyon punctiger* Knisch, 1921

apiciflavus Hebauer, 2002a: 40 A: NP

punctiger Knisch, 1921a: 79 A: NP ORR

subgenus *Arcocercyon* Hebauer, 2003b: 8 type species *Cercyon dieganus* Régimbart, 1903

circumcinctus Reitter, 1889d: 254 E: AL GR YU A: IN IS TR

ostentum Shatrovskiy, 1999: 5

dieganus Régimbart, 1903a: 48 N: EG AFR

subgenus *Cercyon* Leach, 1817: 95 type species *Dermestes melanocephalus* Linnaeus, 1758

Cercyon Rey, 1886: 156 type species *Sphaeridium minutum* sensu Gyllenhal, 1808 (= *Sphaeridium triste* Illiger, 1801)

Cheilocercyon Seidlitz, 1888: [Arten] 112 type species *Scarabaeus quisquilius* Linnaeus, 1760

Cyceron Shatrovskiy, 1992: 362 (365) type species *Cercyon dux* Sharp, 1873

Epicercyon Kuwert, 1890b: 168 type species *Cercyon granarium* Erichson, 1837

Ercyon Rey, 1886: 129 type species *Sphaeridium littorale* Gyllenhal, 1808

Paraliocercyon Ganglbauer, 1904a: 274 type species *Cercyon depressum* Stephens, 1829

abeillei Guillebeau, 1896b: 231 A: IS TR

aequalipunctus Hebauer, 2002a: 40 A: UP

algarum Sharp, 1873b: 65 A: FE JA

alinae Ryndevich, 2004: 61 A: SCH

alpinus Vogt, 1969: 180 E: AU CZ GB GE IT RO UK YU

aptus Sharp, 1873b: 65 A: FE JA HEB

arenarius Rey, 1885a: 31 E: BU CR FR GR IT SP N: TU A: TR AURi

berlovi Shatrovskiy, 1999: 7 A: GAN QIN SCH XIZ

signifer Hebauer, 2002b: 8

bifenestratus Küster, 1851b: no.15 E: AR AU BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT LU NL NT PL SK ST

 SV SZ UK A: ES FE KZ MG WS

palustris Thomson, 1853: 55

bononiensis Chiesa, 1964a: 118 E: CZ GE HU IT SK SL

hungaricus Endrôdy-Younga, 1967: 67

borealis Baranowski, 1985: 341 E: FI NR SV A: ES FE

castaneipennis Vorst, 2009: 60 E: BY CI CT CZ LA NL PL SK ST SV

cavus Hebauer, 2002a: 40 A: NP

convexusculus Stephens, 1829c: 146 E: AU BY CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LT NL NR NT PL SK SV SZ UK

 "Caucanus" A: ES WS

alvi Vogt, 1969: 186

intermixtus Sharp, 1918: 276

- costiventris* Hebauer, 2002a: 41 A: NP
costulipennis Nakane, 1966: 55 A: JA
cultriformis Wu & Pu, 1995: 125 A: GUA
depressus Stephens, 1829c: 138 E: DE EN FI FR GB GE IR NL NR NT SV UK AURI NARI NTRI
 dorsostriatus Thomson, 1853: 54
 uruguayanus Knisch, 1924c: 120
deserticola Fikáček, Gentili & Short, 2010: 156 A: AE
dilutus Régimbart, 1903c: 338 A: SD ORR
divisus Hebauer, 2002a: 42 A: NP
dux Sharp, 1873b: 65 A: FE JA
emarginatus Baranowski, 1985: 344 E: FI NR SV
fimbriatus Mannerheim, 1852b: 344 Ei: NT NAR
 paradoxus Kuwert, 1890b: 165 (321)
granarius Erichson, 1837: 221 E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FR GB GE HU IT LA LT NL NT PL SK SL SZ YU
 "Caucasus" A: FE KZ XIZ "South Siberia"
haemorrhoidalis Fabricius, 1775: 67 (*Sphaeridium*) E: AL AR AU AZ BH BU BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB
 GE GG GR HU IR IT LA LT ME NL NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG TU A: ES FE IS SY TR WS
 AURI NARI NTRI ORRi
 aquatilis Donisthorpe, 1932d: 129
 basillaris Notman, 1920: 187
 calthae Scopoli, 1763: 18 (*Dermestes*) [DA]
 erythropterus Mulsant, 1844a: 180
 erythropterus Küster, 1851a: no.8 [HN]
 femoralis Stephens, 1829c: 143
 flavipes Fabricius, 1792a: 81 (*Sphaeridium*)
 infuscatus Stephens, 1829c: 144
 nigricollis Say, 1825b: 190 (*Sphaeridium*)
 obscurus Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*) [HN]
 picinus Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*)
 similis Marsham, 1802: 68 (*Dermestes*)
 striatus Turton, 1802: 422 (*Hydrophilus*) [RN]
 suturalis Stephens, 1829c: 142
hebaueri Ryndevich, 2007: 309 A: "India"
impressus Sturm, 1807: 9 (*Sphaeridium*) E: AR AU BU BY CT CZ DE FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT NL NR NT
 PL SK SP ST SV SZ TR UK NARI
 apicalis Dalla Torre, 1877: 73 [HN]
 melanocephaloides Kuwert, 1890b: 163
 piceus Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*) [HN]
 xanthocephalus Stephens, 1829c: 143

- inquinatus* Wollaston, 1854: 103 E: AU AZ CR CZ IT Ni: CI MR A: GUA JA AFRi AURi NARi NTRi ORR
austriacus Vogt, 1974: 190
faeceus Balfour-Browne, 1954: 230
gebieni Knisch, 1925: 202
knischi J. Müller, 1924b: 77
rhombicus Jia, 1995: 128
- jonensis* Nakane, 1965: 54 A: JA
kubaki Ryndevich, 2004: 59 A: SCH
korbianus Kniž, 1912: (169) A: FE WS
kryzhanovskii Shatrovskiy, 1989: 284 A: FE
lateralis Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*) E: AB AR AU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT NL NR
 NT PL PT SK SP ST SV SZ UK YU A: ES FE KZ TD WS NARi
incrematus Notman, 1920: 186
- lencoranus* Kuwert, 1890b: 162 E: AB GG ST
littoralis Gyllenhal, 1808: 111 (*Sphaeridium*) E: AZ DE EN FA FI FR GB GE IR LA LT NL NR NT PL PT RO SP ST
 SV UK YU N: CI A: TR NAR
binotatus Stephens, 1829c: 137
dilatatus Stephens, 1829c: 138
normannus L. Benick, 1916: 204
ruficollis Schilsky, 1888: 190
ruficornis Stephens, 1829c: 137
- lividulus* d'Orchymont, 1926b: 204 A: BT ORR
longulus Hebauer, 2002a: 43 A: NP
marinus Thomson, 1853: 54 E: AU BY CT CZ DE EN FA FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL SP ST SV
 SZ UK "Caucasus" A: ES FE GUA HEI JA KZ MG NMO NP TM TR WS XIN NAR
aquaticus Laporte, 1840b: 61 [HN]
heilongjiangensis Wu & Pu, 1995: 127
- medvedorum* Shatrovskiy, 1999: 5 A: QIN
melanocephalus Linnaeus, 1758: 356 (*Dermestes*) E: AR AU BII BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IC IT
 LA LT NL NR NT PL SK SL SP ST SV SZ UK A: ES LE UZ WS
rubripennis Kuwert, 1890b: 164
- mirandulus* Hebauer, 2002a: 44 A: NP
moroderi Doderò, 1932: 14 E: SP
nigriceps Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*) E: AL AU AZ BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT MA
 NL NR NT PL PT RO SK ST SV SZ UK N: CI MR TU A: BT GUA IN JA NP SA TAI TR YE "India" AFRi AURi
 NARi NTRi ORR
atricapillus Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*)
atriceps Stephens, 1829c: 151
atriceps Gemminger & Harold, 1868: 496 [RN] [HN]
bimaculatus Stephens, 1829c: 152

- centrimaculatus* Sturm, 1807: 23 (*Sphaeridium*)
- inustus* Marsham, 1802: 76 (*Dermestes*)
- laevis* Marsham, 1802: 73 (*Dermestes*)
- mundus* Melsheimer, 1844b: 102
- nigriceps* Motschulsky, 1863: 445 [IIN]
- nubilipennis* Stephens, 1829c: 401
- panamensis* M. Hansen, 1999a: 286 [RN]
- pulchellus* Heer, 1841: 492
- striatus* Sharp, 1882: 108 [HN]
- testaceus* Stephens, 1829c: 152
- ustulatus* Stephens, 1829c: 152 [HN]
- vicinialis* Walker, 1859: 258
- numerosus* Shatrovskiy, 1989: 281 A: FE JA SC
- obsoletus* Gyllenhal, 1808: 107 (*Sphaeridium*) E: AR AU AZ BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA NL NR
NT PL PT SK SL SP SV SZ UK N: AG
- obscurus* Dalla Torre, 1877: 73 [HN]
- tristis* Dalla Torre, 1877: 73 [HN]
- olibrus* Sharp, 1874e: 418 A: FE JA JIX TAI
- omyenus* Hebauer, 2002a: 45 A: NP
- ovillus* Motschulsky, 1860b: 129 A: ANH ES FE JA MG NMO WS XIN
- paranigriceps* Ryndevich & Hebauer, 2010: 335 A: FE ORR
- parametricus* Hebauer, 2002a: 45 A: NP
- peltoides* Hebauer, 2002a: 46 A: NP
- pentatomicus* Hebauer, 2002a: 46 A: NP
- pseudodilutus* Satô, 1979: 52 A: NP SD
- pygmaeus* Illiger, 1801: 40 (*Sphaeridium*) E: AR AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT ME NL
NR NT PL SK SL SP ST SV SZ UK YU N: EG A: ES IN WS NARI
- apicalis* Say, 1823: 203 (*Sphaeridium*)
- conspurcatus* Sturm, 1807: 15 (*Sphaeridium*)
- erythropus* Stephens, 1829c: 148
- fuscescens* Stephens, 1829c: 150
- merdarius* Sturm, 1807: 26 (*Sphaeridium*)
- stercorator* Stephens, 1829c: 147
- quisquilius* Linnaeus, 1760: 138 (*Scarabaeus*) E: AR AU BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT
NL NR NT PL PT RO SK SP SV SZ UK YU N: CI EG MR TU A: CY ES FE GUX IS JA JIX KI KZ MG NMO NP
QIN SA SHG TD TR WS AURI NARI NTRI
- dispar* Paykull, 1798: 62 (*Sphaeridium*) [DA]
- flavipennis* Küster, 1848b: no.56
- flavus* Marsham, 1802: 71 (*Dermestes*)
- guangxiensis* Wu & Pu, 1995: 128

- minimus* Scopoli, 1763: 12 (*Scarabaeus*)
mulsanti Ganglbauer, 1904a: 280 [RN]
xantopterus Laicharting, 1781: 85 (*Sphaeridium*)
renneri Hebauer, 1997b: 73 E: GEi
rhomboidalis Perris, 1874: 3 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
rotundulus Sharp, 1884b: 460 A: FE JA
rufinotus Hebauer, 2002a: 47 A: NP
rufosaturatus Hebauer, 2002a: 48 A: NP
saluki Ryndevich, 1998: 63 A: FE
scaevus Hebauer, 2002a: 48 A: NP
sculptus Hebauer, 2002a: 48 A: NP
sericatus Hebauer, 2002a: 49 A: NP
setiger Wu & Pu, 1995: 128 A: GUA GUI ORR
setulosus Sharp, 1884b: 458 A: FE JA NAR
shinanensis Nakane, 1965: 54 A: JA
spatiferides Newton, nom. nov. [see New Acts] A: NP
spatifer Hebauer, 2002a: 49 [HN]
sternalis Sharp, 1918: 276 E: AU AZ BY CR CT CZ DE FI GB GE GG IR IT NL PL SK ST SV UK A: IN WS
pumilio Sharp, 1918: 277
strandi Roubal, 1938: 56 E: AR ST A: TR
subopacipennis Nakane, 1965: 53 A: JA
subsulcatus Rey, 1885a: 32 E: BH BY CR CT FR GE IT SP ST UK
agnotus Kuwert, 1888a: 38
symbion Shatrovskiy, 1989: 281 A: FE JA
tabellarius Hebauer, 2002a: 50 A: NP
tatricus Endrödy-Younga, 1967: 63 E: RO SK UK A: ES FE
exorabilis Shatrovskiy, 1989: 285
terminatus Marsham, 1802: 70 (*Dermestes*) E: AR AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT ME NL
 NR NT PL SK SP SV SZ UK N: AG CI EG MR TU A: FE IS KZ MG SHA WS NARi
basalis Dalla Torre, 1877: 73
exiguus Grimmer, 1841: 40 (*Cambrus*) [DA]
fimetarius Wollaston, 1854: 103
lepidus Wollaston, 1864: 94
marginecollis Dalla Torre, 1877: 73
nanus Melsheimer, 1844b: 102
plagiatus Erichson, 1837: 218
scutellaris Stephens, 1829c: 153
separandus Rey, 1886: 153
torquatus Hebauer, 2002a: 50 A: NP

- tristis* Illiger, 1801: 39 (*Sphaeridium*) E: AU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL PT
SK SP ST SV SZ UK A: ES FE KZ MG WS
- boletophagus* Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*)
- convexius* Stephens, 1829c: 145
- laevigatus* Stephens, 1829c: 140
- uenoi* Satô, 1984: 1 A: JA
- unipunctatus* Linnaeus, 1758: 364 (*Coccinella*) E: AR AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IC IR IT LA LT
NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE HEI JA KZ WS NARi
- cordiger* Herbst, 1784: 122 (*Hydrophilus*)
- dispar* Paykull, 1798: 62 (*Sphaeridium*) [DA]
- impunctatus* Kuwert, 1890b: 166
- janssoni* Nyholm, 1952: 207
- unipustulatus* Nakane, 1982: 101 A: FE JA
- ustus* Sharp, 1874e: 418 A: FE JA TAI
- verus* Shatrovskiy, 1989: 282 A: FE WS
- wui* M. Hansen, 1999a: 293 [RN] A: GUA
- striatus* Wu & Pu, 1995: 129 [HN]
- yayeyama* Chôjô & Satô, 1970: 7 A: JA
- chujoi* Satô, 1985: 212
- subgenus** *Clinocercyon* d'Orchymont, 1942a: 2 type species *Cercyon grandis* Laporte, 1840
- aequalis* Sharp, 1884b: 459 A: JA
- placidoides* Zaitzev, 1908b: 41 [RN]
- hanseni* Jia, Fikáček & Ryndevich, 2011: 42 A: GUI JIX
- incretus* d'Orchymont, 1941a: 9 A: FUJ
- lineolatus* Motschulsky, 1863: 444 (*Trichopoda*) A: AE GUA NP YUN TAI ORR AFRi
- nigrostriatus* Wu & Pu, 1995: 127
- nepalensis* Ryndevich, 2011: 399 A: NP
- placidus* Sharp, 1884b: 459 A: JA
- rubicundus* Sharp, 1884b: 460 A: JA
- subgenus** *Conocercyon* Hebauer, 2003b: 30 type species *Cercyon crenatostriatus* Régimbart, 1903
- sanaii* Hoshina, 2008: 2 A: JA
- vagus* Sharp, 1884b: 459 A: FE JA SC
- subgenus** *Dicyrtocercyon* Ganglbauer, 1904a: 274 type species *Sphaeridium ustulatum* Preyßler, 1790
- diversipunctus* Hebauer, 2002a: 41 A: NP UP
- ustulatus* Preyßler, 1790: 34 (*Sphaeridium*) E: AU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU MC NL NR
NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK YU A: TR NARi
- haemorrhoidalis* Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*) [HN]
- haemorrhoum* Gyllenhal, 1808: 107 (*Sphaeridium*) [RN]
- xanthorhoeus* Stephens, 1829c: 143
- subgenus** *Himalcercyon* Hebauer, 2002a: 39 type species *Cercyon mirus* Hebauer, 2002
- mirus* Hebauer, 2002a: 39 A: NP

- subgenus *Paracercyon* Seidlitz, 1888: [Gattungen] 23 type species *Hydrophilus analis* Paykull, 1798
analis Paykull, 1798: 187 (*Hydrophilus*) E: AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IC IR IT LA LT NL NR
 NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU "Caucasus" N: AG A: ES FE KZ TR WS AURi NARi
acutus Stephens, 1829c: 139
apicalis Stephens, 1829c: 140
aquaticus Stephens, 1829c: 138
maculatus Melshcimer, 1844b: 101
honorabilis Shatrovskiy, 1999: 7 A: QIN
- subgenus *Paracycreon* d'Orchymont, 1942a: 3 type species *Cercyon hova* Régimbart, 1903
laminatus Sharp, 1873b: 66 Ei: AL AR AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IT LT MD NL PL SP
 ST SV SZ TR UK A: FE GUA GUX HKG HUB HUN IS JA JIL KI KZ NP SCH SHA SHG TAI TR WS ZHE AURi
 ORR PACi NTRi
sharpi Harold, 1878: 68
tropisternus Wu & Pu, 1995: 129
vicinaloides d'Orchymont, 1925c: 278
maculosus Hebauer, 2002a: 44 A: NP
noctuabundus Shatrovskiy, 1992: 367 A: FE GUI
subsolanus Balfour-Browne, 1939c: 4 A: SA GUA JIX TAI "India" ORR
linearis Wu & Pu, 1995: 127
- genus *Cercyon*, species incertae sedis
scitus Walker, 1836: 413 N: CI
 genus *Cercyon*, nomen dubium
elegans Betta, 1847: 25 E: IT
- genus *Cryptopleurum* Mulsant, 1844a: 188 type species *Sphaeridium minutum* Fabricius, 1775
crenatum Kugelann, 1794: 543 (*Sphaeridium*) E: AR AU BE BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IT LT NL
 NR NT PL RO SK SL SP SV SZ TR UK YU A: KZ TR
vaucherii Tournier, 1868: 566
- ferrugineum* Motschulsky, 1863: 448 A: GUA NP SA TAI "India" ORR
minutum Fabricius, 1775: 68 (*Sphaeridium*) E: AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT NL
 NR NT PL PT RO SK SL SP SV SZ UK YU A: ES FE KI KZ NMO WS NARi
pulicarium Thunberg, 1784: 7 (*Hister*) [DA]
sordidus Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*)
- pygmaeum* d'Orchymont, 1913: 15 A: TAI ORR
subtile Sharp, 1884b: 461 Ei: AU BE BY CH CZ DE FI GB GE GG IT NL NR PL SV SZ UK A: BEI ES FE JA JIX KI
 KZ NP TAI ZHE "India" NARi
sulcatum Motschulsky, 1863: 448 A: NP ORR
- genus *Emmidolium* d'Orchymont, 1937e: 466 type species *Emmidolium excavatum* d'Orchymont, 1937
excavatum d'Orchymont, 1937e: 467 A: JA TAI ORR AFR

- genus *Megasternum* Mulsant, 1844a: 187 type species *Dermestes obscurus* Marsham, 1802 (= *Dermestes concinnus* Marsham, 1802)
- concinnum* Marsham, 1802: 74 (*Dermestes*) E: AR AU BE BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE GG GR HU IT LT MC ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG TU A: AHN ES FE TR WS NARI
- acutum* Stephens, 1829c: 139 (*Cercyon*) [DA]
- algericum* J. Sahlberg, 1903d: 17 [DA]
- aquaticum* Stephens, 1829c: 138 (*Cercyon*) [DA]
- brunneum* Dalla Torre, 1877: 73 [DA]
- calabricum* Kuwert, 1890b: 172 (324)
- castaneum* Heer, 1841: 492 (*Cercyon*) [DA]
- caucasicum* Kuwert, 1890b: 171 (323) [DA]
- contaminatum* Stephens, 1829c: 149 (*Cercyon*) [DA]
- convexior* Stephens, 1829c: 146 (*Cercyon*) [DA]
- ferrugineum* Dalla Torre, 1877: 73 [DA]
- immune* Stephens, 1829c: 140 (*Cercyon*) [DA]
- obscurum* Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*) [HN]
- pusillum* Kuwert, 1890b: 173 (325) (*Pachysternum*) [DA]
- stercorarium* Marsham, 1802: 76 (*Dermestes*) [DA]
- testaceum* Stephens, 1829c: 152 (*Cercyon*) [DA]
- immaculatum* Stephens, 1829c: 147 (*Cercyon*) E: GB
- japonicum* Shatrovskiy, 1989: 286 A: FE JA
- prometheus* Shatrovskiy, 1990: 83 E: GG ST

- genus *Nipponocercyon* Satô, 1963b: 267 type species *Nipponocercyon shibatai* Satô, 1963
- shibatai* Satô, 1963b: 267 A: JA
- monticola* Nakane, 1968: 86 A: JA
- oyamanum* Nakane, 1968: 86
- sichuanicus* Ryndevich, 2005: 244 (*Cryptopleurum*) A: SCH

- genus *Oosternum* Sharp, 1882: 112 type species *Oosternum costatum* Sharp, 1882 (= *Oosternum sharpi* M. Hansen, 1999)
- Pemelus* Horn, 1890b: 309 type species *Megasternum costatum* LeConte, 1855
- atramentarium* Hebauer, 2002a: 54 A: NP
- okinawaense* Hoshina, 2011: 231 A: JA
- robiginosum* Hebauer, 2002a: 55 A: NP
- rudicolle* Hebauer, 2002a: 56 A: NP
- sericicolle* Hebauer, 2002a: 56 A: NP
- sharpi* M. Hansen, 1999c: 242 [RN] Ei: AZ AFRI NAR NTR ORRi
- costatum* Sharp, 1882: 113 [FIN]
- shigehisai* Hoshina & Satô, 2004: 11 A: JA
- soricoides* d'Orchymont, 1941a: 13 A: FUJ JIX JA
- sugitai* Hoshina, 2009: 2 A: JA

takedai Hoshina & Satô, 2005: 2 A: JA

toshüei Hoshina & Satô, 2004: 9 A: JA

genus *Oreocyon* Hebauer, 2002a: 35 type species *Oreocyon frigidus* Hebauer, 2002

frigidus Hebauer, 2002a: 36 A: NP ORR

genus *Pachysternum* Motschulsky, 1863: 446 type species *Pachysternum nigrovittatum* Motschulsky, 1863

Pigrillum Knisch, 1921a: 72 type species *Cercyon villosus* Régimbart, 1907

apicatum Motschulsky, 1863: 448 A: HAI ORR

brunneum Balfour-Browne, 1951: 209 A: YE

capense Mulsant, 1844c: 381 (*Cryptopleurum*) Ei: FR GR HU IT RO Ni: CI MR AFR AURi NTRI

figuratum Gerstaecker, 1867: 26 (*Cercyon*)

rufocaudatum Fairmaire, 1893b: 526 (*Cercyon*)

scapulare Boheman, 1851: 608 (*Cercyon*)

cardoni d'Orchymont, 1926b: 220 A: AP CE GUI NP SD SE SW ORR

haemorrhoum Motschulsky, 1866: 168 A: ES FE JA MG NMO NO NE KZ WS "Korea"

distinctum Sharp, 1873b: 66 (*Megasternum*)

gibbulum Motschulsky, 1866: 169 (*Megasternum*)

sibiricum Kuwert, 1890b: 172 (324)

kubani Fikáček, Jia & Prokin, 2012: 31 A: SCH ORR

nigrovittatum Motschulsky, 1863: 447 A: CE FUJ GUA GUX HAI HKG NP SD SE SW UP ORR

rugosum Fikáček, Jia & Prokin, 2012: 38 A: GAN SHA

stevensi d'Orchymont, 1926b: 220 A: FUI GUA GUX YUN CE SE SW NP SD UP ORR

nigratum Jia, Wu & Pu, 1998: 125 (127)

genus *Pacrillum* d'Orchymont, 1941a: 14 type species *Pacrillum chinense* d'Orchymont, 1941

Aгнаеformia Shatrovskiy, 1989: 286 type species *Aгнаеformia lucida* Shatrovskiy, 1989

chinense d'Orchymont, 1941a: 16 A: FUJ SCH

cyrilloideum Fikáček & Hebauer, 2006: 60 A: NP

lucidum Shatrovskiy, 1989: 286 (*Aгнаеformia*) A: FE

manchuricum d'Orchymont, 1941a: 17 A: "Southern Manchuria"

genus *Paroosternum* Scott, 1913: 220 type species *Paroosternum degayanum* Scott, 1913

Anchorosternum Jia, Wu & Pu, 2001: 155 type species *Anchorosternum sinensis* Jia, Wu & Pu, 2001

saundersi d'Orchymont, 1925c: 289 (*Oosternum*) A: NP ORR

sorex Sharp, 1874e: 418 (*Cercyon*) A: GUA GUX HKG JA TAI AFRI AURI ORR

horni d'Orchymont, 1914: 326 (*Oosternum*)

sinense Jia, Wu & Pu, 2001: 157 (*Anchorosternum*)

genus *Pelosoma* Mulsant, 1844a: 184 type species *Pelosoma lafertei* Mulsant, 1844

Merosoma Balfour-Browne, 1939b: 472 type species *Pelosoma eremita* Knisch, 1925

lafertei Mulsant, 1844a: 185 Ei: FR IT NTR

meridionale Bruch, 1915: 468

tribe Omicrini Smetana, 1975

genus *Microgioton* d'Orchymont, 1937e: 463 type species *Mirogioton coomani* d'Orchymont, 1937

Ischyromicrus Malcolm, 1981: 264 type species *Ischyromicrus julieae* Malcolm, 1981

grandis Bameul, 1994b: 134 A: SD

genus *Noteropagus* d'Orchymont, 1919: 132 type species *Noteropagus politus* d'Orchymont, 1919

politus d'Orchymont, 1919: 134 A: UP AUR ORR

genus *Oreomicrus* Malcolm, 1980: 186 type species *Oreomicrus explanatus* Malcolm, 1980

tristis Bameul, 1994a: 80 A: NP

genus *Paromicrus* Scott, 1913: 206 type species *Paromicrus carinatus* Scott, 1913

affinis d'Orchymont, 1919: 127 A: JA

annandalei d'Orchymont, 1919: 130 A: AP BT

genus *Peratogonus* Sharp, 1884b: 461 type species *Peratogonus reversus* Sharp, 1884

grandis Malcolm, 1981: 263 A: SD

reversus Sharp, 1884b: 461 A: JA TAI

genus *Psalitrus* d'Orchymont, 1919: 123 type species *Psalitrus vandenbosscheae* d'Orchymont, 1919

fallax Balfour-Browne, 1948b: 384 A: UP

masatakai Hoshina, 2007c: 42 A: JA

sauteri d'Orchymont, 1929a: 92 A: TAI

smetanae Bameul, 1992: 103 A: NP

temperei Bameul, 1992: 105 A: NP

yamatensis Hoshina & Satô, 2005: 15 A: JA

tribe Protosternini M. Hansen, 1991

genus *Protosternum* Sharp, 1890: 356 type species *Protosternum atomarium* Sharp, 1890

Blanodium d'Orchymont, 1926a: 99 type species *Dactylosternum abnormale* d'Orchymont, 1913

abnormale d'Orchymont, 1913: 10 (*Dactylosternum*) A: TAI ORR

arunvallense Hebauer, 2002a: 34 A: NP

tribe Sphaeridiini Latreille, 1802

genus *Sphaeridium* Fabricius, 1775: 66 type species *Dermestes scarabaeoides* Linnaeus, 1758

Sphaeridiolinus Minozzi, 1921: 54 type species *Sphaeridium bipustulatum* Fabricius, 1781

bipustulatum Fabricius, 1781a: 78 E: AR AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT MC

MD NL NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG CI EG TU A: AF ES IS KZ MG TD TR WS NARi

basalis Dalla Torre, 1877: 72 [DA]

bimaculatum Kuwert, 1890b: 174 [HN] [DA]

daltoni Stephens, 1829c: 156 [DA]

haemorrhoum Schrank, 1781: 26 (*Dermestes*)

- humerale* Westhoff, 1881: 61 [DA]
lunulatum Stephens, 1829c: 155 [DA]
marginatum L.G. Scriba, 1790b: 164 [HN] [DA]
quadrinaculatum Herbst, 1783: 30 [HN] [DA]
renipustulatum Heer, 1841: 488 [DA]
semistriatum Laporte, 1840b: 60 [DA]
tauricum Motschulsky, 1849: 94 [HN]
testaceum Heer, 1841: 488 [HN] [DA]
testudinarium Geoffroy, 1785: 24 (*Dermestes*) [HN]
- caffrum* Laporte, 1840b: 60 A: YE AFR
apicale Boheman, 1851: 606
- densepunctatum* Berlov & Shatrovskiy, 1989: 277 A: FE "North China"
dimidiatum Gory, 1834: pl. 20 [fig. 15] A: JA SD TAI UP ORR
cameroni d'Orchymont, 1926b: 202
dimidiatum Laporte, 1840b: 60 [HN]
- discolor* d'Orchymont, 1933a: 298 A: GUA GUX TAI UP AUR ORR
exile Boheman, 1851: 607 A: YE AFR
- lunatum* Fabricius, 1792a: 78 E: AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE IR IT I.A LT NL NR NT PL SK
 SL SP SV SZ UK YU N: AG A: FE IS JO KZ MG NW SY TD WS NARi
bimaculatum Ragusa, 1891: 136 [HN] [DA]
- marginatum* Fabricius, 1787: 43 E: BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IR IT MC PL RO SK SL SP ST SZ TR
 UK N: AG TU A: CY TD TR UZ WS "Middle East" "Near East" NARi
- quinquemaculatum* Fabricius, 1798: 39 A: FUJ GUA GUX JA JIA JIX NP SA TAI "India" ORR
chinense J. Frivaldszky, 1889: 197
tricolor Walker, 1858: 209 [HN]
vicinum Laporte, 1840b: 60
- reticulatum* d'Orchymont, 1929b: 410 E: TR A: HP GUA JIX SCH SHN TAI UP ORR
- scarabaeoides* Linnaeus, 1758: 356 (*Dermestes*) E: AB AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG
 HU IR IT LA LT MC NL NR NT PL PT RO SK SL SP SV SZ N: TU A: ES FE HEI IS JA KI KZ NMO TD TR UK
 UZ WS AFRi AURi NARi
crenatum Palisot de Beauvois, 1817: 158 [HN]
pictum Ménériés, 1832: 172
pictum Faldermann, 1835a: 235 [HN]
quadrinaculatum Schrank, 1781: 25 (*Dermestes*)
quadrinaculatum Marsham, 1802: 66 (*Dermestes*) [IIN]
quadrinaculatum Küster, 1845: no. 23 [HN]
striolatum Heer, 1841: 487
testudinarium De Geer, 1774: 345 (*Hister*) [RN]
tricolor Geoffroy, 1785: 24 (*Dermestes*)
- senegalense* Laporte, 1840b: 61 A: YE AFR
zavattarii Marcuzzi, 1941: 107
- seriatum* d'Orchymont, 1913: 12 A: NP FUJ GUA HAJ HUN "India" ORR
severini d'Orchymont, 1919: 116 A: HKG NP SD YUN ORR

substriatum Faldermann, 1838: 8 E: AB AR AU AZ BH BU CR CZ DE FR GE GR HU IT LT MC ME PL SK ST UK
N: AG EG TU A: ES FE IS KA KZ LIA MG NE NMO SHX TD TM TR WS

atratum Ragusa, 1891: 136

genus *Sphaeridium*, **nomina dubia** (possibly not Hydrophiloidea)

bipunctatum Thunberg, 1794c: 102 [DA] E: SV

bipustulatum Thunberg, 1794c: 102 [HN] [DA] E: SV

inquatum Kugelann, 1798: 69 [DA] E: PL

pellucidum P. Rossi, 1794: 83 [DA] E: IT

plagiatum Thunberg, 1794c: 101 [DA] E: SV

punctiforme Schrank, 1798: 444 [DA] E: GE

rubrum Thunberg, 1794c: 100 [DA] E: SV

ruficollis Frölich, 1792: 121 [HN] [DA] E: GE

rufipes Schrank, 1785: 315 [DA] E: GE

rufipes Thunberg, 1794c: 101 [HN] [DA] E: SV

testudineum P. Rossi, 1794: 83 [DA] E: IT

vaccarium Kugelann, 1798: 69 [DA] E: PL

family SPHAERITIDAE Shuckard, 1839

genus *Sphaerites* Duftschmid, 1805: 205 type species *Hister glabratus* Fabricius, 1792

dimidiatus Jureček, 1934: 45 A: GAN SCH SHA

glabratus Fabricius, 1792a: 73 (*Hister*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LS LT LU NL NR

NT PL RO SK SL SV SZ UK A: ES FE JA JIL MG WS

involutilis Gusakov, 2004: 182 A: SCH

nitidus Löbl, 1996: 196 A: GAN SCH

opacus Löbl & Háva, 2002: 179 A: SHA

family SYNTELIIDAE Lewis, 1882

genus *Syntelia* Westwood, 1864: 11 type species *Syntelia indica* Westwood, 1864

davidis Fairmaire, 1889a: 11 A: SCH

histeroides Lewis, 1882: 137 A: FE JA

indica Westwood, 1864: 11 A: NP SD

mazuri Zhou, 2003: 269 A: SCH

sinica Zhou, 2003: 267 A: SCH

family HISTERIDAE Gyllenhal, 1808

subfamily Abracinae W.S. Macleay, 1819

tribe Abraeini W.S. Macleay, 1819

genus *Abraeus* Leach, 1817: 76 type species *Hister globosus* Hoffmann, 1803 (= *Hister perpusillus* Marsham, 1802)

subgenus *Abraeus* Leach, 1817: 76 type species *Hister globosus* Hoffmann, 1803 (= *Hister perpusillus* Marsham, 1802)

Habraeus Agassiz, 1846: 170 [unjustified emendation]

areolatus Reitter, 1884a: 7 E: AB A: IN

loebli Gomy & Óhara, 2001: 3 A: JA