


Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Национальная академия наук Беларуси

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ



ЖИВОТНЫЕ



Минск
«Беларусь»
2025

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды диких животных
5-е издание

УДК 502.172:502.211592/599(476)

ББК 28.088(4Бей)

К78

Редакционная коллегия:

Председатель

С.М. Масляк, министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь

Заместители председателя:

М.Е. Никифоров, академик НАН Беларуси,

В.И. Парфенов, академик НАН Беларуси

Члены редакционной коллегии:

А.И. Чайковский, генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»,
кандидат биологических наук;

Д.Г. Груммо, директор ГНУ «Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси»,
доктор биологических наук;

С.С. Савчук, заведующий лабораторией флоры и систематики растений Института
экспериментальной ботаники НАН Беларуси, кандидат биологических наук;

ИЗ Самусенко, заведующий лабораторией орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам,
кандидат биологических наук;

Т.Г. Шабашова, заведующий лабораторией микологии Института экспериментальной ботаники
НАН Беларуси, кандидат биологических наук;

А.В. Кулак, ведущий научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук;

Т.В. Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Редакционный совет:

А.Н. Карлюкевич (главный редактор), И.А. Федорова, О.В. Давидович,
Е.И. Бужинская, Л.В. Языкович

*Выпуск издания осуществлен по заказу и при финансовой поддержке
Министерства информации Республики Беларусь*

1БВЫ 978-985-01-1968-1

© Оформление. УП «Издательство
«Беларусь», 2025

© Картоснова. Государственный
комитет по имуществу
Республики Беларусь, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 4

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 9



ПТИЦЫ 59



АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ 189



МИНОГИ И ЛУЧЕПЕРЫЕ (МИНОГИ, КОСТНЫЕ РЫБЫ) 199



НАСЕКОМЫЕ 221



КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ, ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
(РАКООБРАЗНЫЕ, ХЕЛИЦЕРОВЫЕ), МОЛЛЮСКИ 393



УКАЗАТЕЛИ 416

ПРИЛОЖЕНИЕ 425




ПЛАВУНЕЦ ШИРОЧАЙШИЙ
ПЛЫВУНЕЦ НАЙШЫРЭЙШЫ
DYTISCUS LATISSIMUS (LINNAEUS, 1758)

Статус. Национальный: III категория национальной природоохранной значимости. Вид включен в 3-е и 4-е издания Красной книги Республики Беларусь. Международный: вид включен в Красную книгу МСОП (VU), Приложение I/III к Бернской конвенции, Приложение II к Директиве Совета Европы об охране естественных биотопов, в Красные книги Германии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Финляндии, Чехии, Российской Федерации и некоторых ее регионов — Московской, Смоленской, Ленинградской, Псковской, Белгородской, Воронежской, Тверской, Новгородской, Липецкой обл.

Краткое описание. Тело широкоовальное, сверху зелено-черное, слабо выпуклое, блестящее у самцов и матовое у самок, длиной 36—45 мм. Верхняя губа, наличник, внутреннее пространство вокруг глаз и V-образное пятно на темени желтые. Усики и максиллярные щупики

желтые или желто-красные. Последние членики на вершинах затемнены. Бока переднеспинки расширены и уплощены. Углы переднеспинки у самцов округлены на вершинах, у самок углы острые. Желтая кайма на переднеспинке широкая на боках и переднем крае, на основании довольно узкая, с утолщением посередине. Щиток по бокам с желтой каймой. Надкрылья сильно расширены, эпиплевры очень широкие и сильно уплощены. Боковая желтая кайма широкая, суживается на середине, у вершины становится совсем узкой. У вершин надкрылий также имеется косая желтая полоса, идущая от бокового края к шву. Надкрылья у самцов каждое с двумя четкими пунктирными рядами и двумя плохо заметными из самых крупных и глубоких точек. Надкрылья самок с 10 глубокими продольными бороздками каждое, которые не доходят до вершин. Первые четыре бороздки полностью желтые, а 5—7-я — только до середины. Место соединения восьмой и девятой борозды желтые. Низ тела желтый или красновато-желтый. Боковые лопасти заднегруди темнее общего фона. Отростки задних тазиков заострены на вершинах. Анальный стернит самца с маленькой вырезкой, самки — с глубокой. Ноги желтые или красновато-желтые. Коготки и шпоры коричневые. Длина 36—44 мм. Личинки крупные с длинным веретеновидным телом и с узкими вы-



тянутыми последними сегментами с церками на конце, бурого цвета. Голова крупная с острыми серповидными челюстями. На предимагинальных стадиях могут достигать от 40 до 55 мм.

Распространение. Широко распространен в Северной, Центральной и Восточной Европе, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии. В Беларуси распространен локально по всем областям, за исключением некоторых центральных и южных районов Могилевской обл. [1—4].

Биология. Спаривание происходит осенью, после чего имаго зимуют в воде. Самки начинают откладку яиц с середины весны до начала лета в ткани водных растений, на их поверхность либо в ил или в растительные остатки на дне. В спектр питания личинок входят личинки и куколки ручейников, нимфы поденок, изоподы. Перед окукливанием личинка покидает водную среду и в течение суток устраивает себе на берегу в почве колыбельку из растительных остатков и комочков земли. Стадия куколки длится около месяца. Если окукливание происходит в конце лета, то куколка и зимует. Зимуют и взрослые жуки либо на дне, либо где-нибудь поблизости от водоема: во мху, под опавшими листьями. Жизнеспособность имаго исчисляется несколькими годами, вплоть до 4 лет. Имаго и личинки последних возрастов используют в пищу водных беспозвоночных, мелких рыб и головастиков различных земноводных. Вид требователен к содержанию кислорода в воде, ее химическому составу и негативно относится к резким температурным колебаниям водной среды, поэтому может считаться видом — индикатором чистых водоемов.

Места обитания. Вид обитает в реках, старицах рек, озерах, водохранилищах и каналах, предпочитая медленнотекущие водотоки, крупные озера (не менее 1 га) и пруды. Имаго и личинки придерживаются прибрежной части и мелководий водоемов.


Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид, численность которого низка во многих странах Европы.

Меры охраны. Выявление и передача мест обитания вида под охрану. В пределах охраняемых водотоков и водоемов необходимо запретить строительство водохозяйственных сооружений и устройств, работы, связанные с изменением рельефа дна или береговой линии; в водоохранной зоне — строительство предприятий агропромышленного комплекса, сброс сточных вод, применение всех видов удобрений.

Источники информации:

1. ІпаШгаН5Т, 2024;
2. Красная книга Республики Беларусь. Животные, 2015;
3. А1ехапс1го\л\лсх, 2023;
4. Рындевич, 2020.

Авторы-составители С.К. Рындевич, А.А. Семеняк.



РОГАЧИК СКРОМНЫЙ РАГАЧЫКСЦІПЛЫ CERUCHUS CHRYSOMELINUS (HOCHENWART, 1785)

Статус. Национальный: III категория национальной природоохранной значимости. Вид включен во 2—4-е издания Красной книги Республики Беларусь. Международный: как вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимо-